

ارتباط عوامل دموگرافیک مادر با تولد نوزاد کم وزن در ایران: یک فراتحلیل

سلمان دلیری^۱، آرزو کریمی^۲، کورش سایه‌میری^{۳*}، علی دلپیشه^۴

تاریخ دریافت ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ تاریخ پذیرش ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

چکیده

پیش‌زمینه و هدف: وزن هنگام تولد، یکی از شاخص‌های مهم سلامتی در نوزادان می‌باشد. تولد نوزادان کم وزن یکی از مهم‌ترین مشکلات بهداشتی و از اصلی‌ترین علل مرگ نوزادان می‌باشد. مطالعه حاضر باهدف تعیین ارتباط عوامل دموگرافیک مادر با تولد نوزاد کم وزن بهصورت فراتحلیل در ایران انجام شد.

مواد و روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه فراتحلیل در مورد ارتباط عوامل دموگرافیک مادر با تولد نوزاد کم وزن در کشور ایران می‌باشد که بر روی مقالات منتشرشده در کشور ایران انجام شد. به این منظور با جستجو در بانک‌های اطلاعاتی Medlib, SID, ISI, Pubmed, Google scholar, Irandoc, Iranmedex, Magiran و Scopus با استفاده از واژگان کلیدی و ترکیبات آن‌ها کلیه مقالات مرتبط توسط دو پژوهشگر آموزش‌دیده بهطور مستقل استخراج شدند. نتایج مطالعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 و STATA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: در جستجوی اولیه از تعداد ۴۹ مقاله، ۲۸ مقاله شرایط ورود به مطالعه را داشتند. وزن مادر در ابتدای بارداری بیشترین (OR ۲/۸۲؛ ۰/۶۱) و شغل مادر (OR ۱/۱۵؛ CI ۹۵/۷۷-۸۴/۱) کمترین ارتباط را با تولد نوزاد کم وزن داشتند.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه بین تولد نوزاد کم وزن با وزن مادر در ابتدای بارداری، سن کمتر از ۱۹ سال مادر، تحصیلات مادر و محل سکونت ارتباط معنی‌داری وجود داشت. لذا کنترل عوامل خطر فوق‌الذکر در مادران قبل از باردار شدن می‌تواند منجر به کاهش تولد نوزاد کم وزن شود.

کلمات کلیدی: ایران، کم وزنی بدو تولد، عوامل دموگرافیک مادر، فراتحلیل

مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره چهاردهم، شماره دوازدهم، پی‌درپی ۸۹، اسفند ۱۳۹۵، ص ۱۰۰-۹۹

آدرس مکاتبه: مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی، دانشکده پزشکی ایلام، ایلام، ایران. تلفن: ۰۹۱۸۳۴۱۰۷۸۲

Email: sayehmiri@razi.tums.ac.ir

نوزادان در ۲۴ ساعت اول پس از تولد در نوزادان کم وزن اتفاق می‌افتد^(۴).

شیوع کم وزنی هنگام تولد در جمعیت‌های مختلف متفاوت است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سال ۲۰۰۰ به طور کلی سالانه ۱۸ میلیون نوزاد کم وزن در دنیا متولد می‌شوند که معادل ۱۴ درصد از کل تولدات می‌باشد^(۵). این آمار در ایران ۵۶/۱۱ درصد از کل تولدات است^(۶). کم وزنی هنگام تولد در کشورهای پیشرفته و همچنین کشورهای در حال توسعه، فشار فوق العاده‌ای بر سیستم خدمات بهداشتی و افراد خانواده تحمیل می‌کند^(۷).

مقدمه

امروزه تولد نوزاد کم وزن یکی از جدی‌ترین مشکلات بهداشتی جهان محاسب می‌شود^(۱). وزن کم هنگام تولد به معنی وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم نوزاد است و وزن بسیار کم هنگام تولد به معنی وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم نوزاد است و همچنین وزن بی‌نهایت کم هنگام تولد در مورد نوزادانی به کار می‌رود که وزن آن‌ها در هنگام تولد کمتر از ۱۰۰۰ گرم باشد^(۲). نوزادان کم وزن به دلیل شرایط خاص خود قادر به سازگاری با محیط خارج از رحم نیستند و بیشتر در معرض خطر مرگ و میر قرار دارند^(۳). میزان مرگ و میر نوزادان کم وزن ۴۰ برابر و نوزادان خیلی کم وزن ۲۰۰ برابر نسبت به نوزادان تولد یافته با وزن طبیعی بیشتر است. در ایران نیز دو سوم مرگ و میر

^۱ کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

^۲ کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

^۳ دانشیار آمار زیستی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

^۴ استاد اپیدمیولوژی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

فهرستی از چکیده مقالات تهیه شد. پس از مخفی کردن مشخصات مقالات مانند نام نویسنده، نام مجله و غیره متن کامل مقالات در اختیار دو نفر پژوهشگر آموزش دیده و مسلط به مرور مقالات قرار گرفت. هر مقاله توسط دو نفر به طور مستقل مروربررسی قرار گرفت و در صورت رد مقالات توسط دو نفر دلیل آن ذکر گردید و در صورت اختلاف نظر بین آنها مقاله توسط نفر سوم داوری گردید. جهت بررسی کیفیت مقالات از چکلیست استروپ استفاده گردید.^(۱۸) این چکلیست دارای ۲۲ قسمت می‌باشد که امتیازدهی بر اساس اهمیت هر قسمت با توجه به مطالعه حاضر انجام شد. امتیاز نهایی چکلیست ۳۰ بود که حداقل امتیاز قابل قبول ۱۵ بود.

استخراج داده‌ها:

استخراج داده‌های موردنیاز با استفاده از چکلیست از قبل تهیه شده‌ای که شامل حجم نمونه، مکان مطالعه، زمان مطالعه، نوع مطالعه، نسبت شانس متغیرها و فاصله اطمینان انجام شد. در مواردی که مطالعات به صورت مستقیم نسبت شانس را ذکر نکرده بودند این میزان با محاسبه داده‌های مربوط به نسبت شانس، برآورد گردید. نسبت شانس متغیرهای موردمطالعه به صورت: نسبت سن ۳۰ مادر کمتر از ۱۹ سال و بالای ۳۰ سال به سن مادر بین ۲۰ تا ۳۰ سال، وزن مادر کمتر از ۵۰ کیلوگرم به وزن مادر بالای ۵۰ کیلوگرم، مادران شاغل نسبت به مادران خانه‌دار، مادران بی‌س vad به باساد و محل سکونت شهر به روستا محاسبه گردید.

معیارهای ورود و خروج مطالعات:

معیارهای ورود به مطالعه شامل کلیه مطالعات فارسی و انگلیسی‌زبان منتشرشده در کشور ایران که در مورد کموزنی بدو تولد بودند، در کلیه زنان جامعه انجام شده و پس از طی مراحل ارزیابی کیفیت امتیاز بالاتر از ۲۰ را کسب نموده بودند دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند. و معیارهای خروج از مطالعه شامل مطالعاتی که پس از ارزیابی امتیاز کمتر از ۲۰ کسب نموده بودند، در گروههای خاص جمعیتی انجام شده بودند، فاقد تعداد نمونه کافی بودند، در مورد کموزنی بدو تولد بحث کرده بودند ولی شیوع گزارش نشده بود، مطالعات مداخله‌ای، کیفی و یا سری موارد از مطالعه خارج گردیدند.

بر این اساس ۴۹ مقاله مرتبط با کموزنی بدو تولد در کشور یافت شد که از این تعداد ۶ مقاله به دلیل تکراری بودن و ۱۲ مقاله به دلیل غیر مرتبط بودن از مطالعه حذف شدند. پس از بررسی چکیده مقالات ۳ مقاله فاقد اطلاعات موردنیاز بودند و از مطالعه حذف شدند. درنهایت ۲۸ مقاله دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند وارد فرایند فراتحلیل شدند (شکل ۱).

آنالیز آماری:

عوامل زیادی بر کموزنی زمان تولد تأثیر می‌گذارند که از مهم‌ترین این عوامل می‌توان عوامل ژنتیکی، محیطی، جنینی، جفتی و مادری را نام برد^(۱۹). علاوه بر این عواملی نظری وضعیت اقتصادی اجتماعی، سن مادر، فاکتورهای نژادی، شغل، تحصیلات مادر، فصل تولد و خشونتهای خانگی نیز بر وزن هنگام تولد تأثیرگذار هستند^(۱۵-۱۶). طبق تحقیقات صورت گرفته احتمال وزن کم بدو تولد در بارداری‌های زیر ۱۹ سال و بالای ۳۵ سال مورد تأیید قرار گرفته است^(۱۶). زنان بالای ۳۵ سال در معرض افزایش خطر عوارض مادر و جنین هستند عوارض مادری شامل چاقی، افزایش فشارخون مزمن ناشی از حاملگی و غیره عوارض پری ناتال شامل تولد نوزاد نارس، مرگ جنین، وزن کم موقع تولد، تأخیر رشد داخل رحمی، بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان و ناهنجاری‌های مادرزادی است^(۱۷).

وزن هنگام تولد وابسته به بسیاری از فاکتورهای ژنتیکی، بیولوژیک، روانی-اجتماعی و محیطی است و گزارش‌های متفاوتی در خصوص تأثیر هر یک از این عوامل با آن وجود دارد و از طرفی وزن هنگام تولد نقش بسیار مهمی بر سلامت دوره‌های بعدی زندگی نوزاد دارد. بنابراین شناسایی عوامل مرتبط با وزن هنگام تولد و اصلاح برخی از فاکتورهای قابل تعديل مانند انتخاب سن مناسب برای بارداری، داشتن وزن مناسب زمان بارداری و غیره مهم به نظر می‌رسد. لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین ارتباط عوامل دموگرافیک مادر با تولد نوزاد کموزن به صورت مرور سیستماتیک و فراتحلیل در ایران انجام شد.

مواد و روش کار


مطالعه حاضر یک مطالعه فراتحلیل در مورد ارتباط عوامل دموگرافیک مادر با تولد نوزاد کموزن در ایران می‌باشد. نتایج این مطالعه بر اساس مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی کسب گردید. در این پژوهش کلیه مقالات انتشار یافته از ابتدای سال ۱۳۷۵ تا پایان سال ۱۳۹۴ طی جستجو در بانک‌های اطلاعاتی, Medlib, SID Scopus, Web of Science ISI, Pubmed, Google Scholar, Irandoc, Iranmedex Magiran و انتخاب گردیدند. جستجوی مقالات با استفاده از کلیدواژه‌های فارسی مانند: کموزنی نوزادان، عوامل مؤثر بر تولد نوزاد کموزن، ایران، عوامل دموگرافیک مادر و غیره به صورت منفرد و مرکب انجام شد و در پایگاه‌های اطلاعاتی خارجی از معادل آنها استفاده گردید.

انتخاب مطالعات:

کلیه مقالات مرتبط با تولد نوزاد کموزن در ایران مطالعه شدند. جستجوی مقالات با یک استراتژی مشخص و توسط دو پژوهشگر آموزش دیده و مسلط به طور مستقل انجام شد. پس از اتمام جستجو

استفاده funnels plot و Egger's test انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار STATA ver11.1 و SPSS20 صورت گرفت.

تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از میانگین وزنی و مدل اثرات تصادفی در متا-آنالیز انجام شد. برای بررسی مقدار ناهمنگونی بین نتایج از فاکتور I₂ و آزمون کوکران و بررسی توزش انتشار از



شکل (۱): فلوچارت جزئیات مراحل ورود و انتخاب مطالعات برای انجام مرور سیستماتیک و فراتحلیل

بین وزن مادر با تولد نوزاد کم‌وزن رابطه معنی‌داری وجود دارد به طوری که احتمال تولد نوزاد کم‌وزن در مادران با وزن زیر ۵۰ کیلوگرم ۲/۸۲ برابر مادران با وزن بالای ۵۰ کیلوگرم می‌باشد. در ۴ مطالعه موردنبررسی بیشترین ارتباط مربوط به مطالعه طباطبایی در سال ۱۳۸۶ (OR: ۰/۹۲ - ۰/۹۵٪ CI: ۳/۴۴ - ۶/۱۳٪) و کمترین ارتباط مربوط به مطالعه جعفری در سال ۱۳۸۳ (OR: ۱/۵۲ - ۰/۴٪ CI: ۱/۱۳ - ۱/۹۵٪) بود که از لحاظ آماری نیز ارتباط معنی‌داری را نشان دادند (نمودار ۳).

یافته‌های حاصل از فراتحلیل ۱۶ مطالعه در زمینه ارتباط سطح تحصیلات مادر نشان داد احتمال تولد نوزاد کم‌وزن در مادران بی‌ساد ۱/۱۶ برابر مادران بساد می‌باشد که این ارتباط از لحاظ آماری معنی‌داری بود (OR: ۱/۶ - ۰/۱٪ CI: ۰/۹۵ - ۱/۲۸٪). در مطالعات موردنبررسی در این زمینه، مطالعه طباطبایی (سال ۱۳۸۶) و مطالعه طبیی (سال ۱۳۸۹) به ترتیب بیشترین (OR: ۴/۵ - ۷/۸۹٪) و کمترین (OR: ۰/۰۶ - ۰/۰۷٪ CI: ۰/۹۵ - ۲/۵۷٪) ارتباط را نشان داده بودند (نمودار ۴). بر اساس یافته‌ها اگرچه اشتغال مادر موجب افزایش تولد نوزاد کم‌وزن می‌گردد ولی این ارتباط از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (OR: ۱/۱۵ - ۱/۸۴٪ CI: ۰/۷۲ - ۰/۹۵٪) (نمودار ۵).

فراتحلیل ۸ مطالعه در زمینه ارتباط محل سکونت با تولد نوزاد کم‌وزن نشان داد، شهرنشینی موجب افزایش ۱/۱۲ برابری در تولد

یافته‌ها

مطالعات نهایی در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۷۵ صورت گرفته بود که شامل ۱۲ مطالعه مورد شاهدی، ۳ مطالعه هم‌گروهی و ۱۳ مطالعه توصیفی مقطعی با حجم نمونه موردنبررسی ۴۸۹۸۸ نفر با میانگین ۱۷۴۹ نمونه در هر مطالعه، دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند و وارد مطالعه گردیدند. یافته‌های حاصل از مطالعات نشان داد، وزن مادر در ابتدای بارداری بیشترین (OR ۲/۸۲٪) و شغل مادر (OR ۱/۱۵٪) کمترین ارتباط را با تولد نوزاد کم‌وزن داشتند. مشخصات مطالعات موردنبررسی در جدول ۱ ارائه گردیده است.


نتایج حاصل از فراتحلیل ۲۴ مطالعه نشان داد سن زیر ۱۹ سال مادر موجب افزایش تولد نوزاد کم‌وزن می‌گردد، به طوری که احتمال تولد نوزادان کم‌وزن در مادران با سن زیر ۱۹ سال ۱/۳۹ برابر مادران با سن ۲۰ تا ۳۰ سال می‌باشد. اگرچه در برخی مطالعات صورت گرفته ارتباط معنی‌داری گزارش نگردیده است فراتحلیل حاضر ارتباط معنی‌داری را نشان داد ($P = 0/0001$). بررسی ۲۰ مطالعه در زمینه ارتباط سن بالای ۳۰ سال مادر با تولد نوزاد کم‌وزن نشان داد که سن بالای ۳۰ سال مادر موجب افزایش تولد نوزاد کم‌وزن می‌گردد ولی ارتباط آماری معنی‌داری مشاهده نشد (۱/۱۹٪، $P = 0/0001$). تست پراکندگی نیز برای این محاسبه مثبت بود ($P = 0/0001$) (نمودار ۲).

که در مناطق شهری وجود دارد قرار گرفته باشد (نمودار ۶). همچنین یافته‌ها نشان داد تورش انتشار با توجه به مقاین بودن نمودار قیفی در انتخاب مطالعات تأثیری نداشته است (نمودار ۷).


نوزاد کموزن می‌گردد (OR: ۱/۱۲ - ۱/۲۴، CI: ۰/۹۵ - ۱/۱۲) به طوری که شناس تولد نوزاد کموزن در مناطق شهری ۱۲ درصد بیشتر از مناطق روسیتایی بود که ممکن است تحت تأثیر برخی از عوامل خطر

جدول (۱): مشخصات کلی مقالات موردبررسی که واجد معیارهای ورود به مطالعه بودند.


نویسنده	مکان انجام مطالعه	سال انجام مطالعه	تعداد نمونه	نوع مطالعه
مهری رنجبران (۱۹)	مرکزی	۱۳۹۳	۴۶۱	توصیفی- مقطعي
زهره محمودی (۲۰)	تهران	۱۳۹۱	۷۵۰	توصیفی- مقطعي
رضاصمن (۲۱)	شهرود	۱۳۹۰	۱۰۰۰	توصیفی- مقطعي
نبیره داودی (۲۲)	مشهد	۱۳۸۹	۲۶۷۴	توصیفی- مقطعي
طاهره طبیبی (۲۳)	ساری	۱۳۸۹	۴۵۰	تحلیلی- هم‌گروهی
نسیم بهرامی (۲۴)	-	۱۳۸۹	۳۰۷۶	تحلیلی- مورد شاهدی
بهروز فدایی (۲۵)	اصفهان	۱۳۸۹	۵۰۰	تحلیلی- هم‌گروهی
محمد رضا زربخش بحری (۲۶)	گیلان	۱۳۸۸	۲۲۵	تحلیلی- مورد شاهدی
شیما طباطبایی (۲۷)	تهران	۱۳۸۶	۱۲۵۰	تحلیلی- مورد شاهدی
سید مصطفی ناچوک (۲۸)	تبریز	۱۳۸۶	۸۷۴	توصیفی- مقطعي
محمد حسین فلاح (۲۹)	بزد	۱۳۸۶	۹۴۱	تحلیلی- مورد شاهدی
محمد رضا اشرفیان (۳۰)	تهران	۱۳۸۶	۳۸۲	تحلیلی- مورد شاهدی
حسین افتخار (۳۱)	بندر عباس	۱۳۸۵	۱۲۰	تحلیلی- مورد شاهدی
پریچهر توتونچی (۳۲)	تهران	۱۳۸۵	۹۰۵	توصیفی- مقطعي
مهرداد میرزا رحیمی (۳۳)	اربدیل	۱۳۸۵	۴۷۰	تحلیلی- مورد شاهدی
معصومه دل آرام (۳۴)	شهرکرد	۱۳۸۴	۵۱۰۲	توصیفی- مقطعي
مریم وحدانیان (۳۵)	تهران	۱۳۸۴	۳۷۳۴	تحلیلی- مورد شاهدی
فاطمه اقبالیان (۳۶)	همدان	۱۳۸۴	۱۵۰۰	توصیفی- مقطعي
فاطمه طاهری (۳۷)	بیرون جند	۱۳۸۳	۲۵۵۸	تحلیلی- مورد شاهدی
رودباری (۳۸)	Zahedan	۱۳۸۳	۱۱۰۹	توصیفی- مقطعي
داود سهرابی (۳۹)	زنجان	۱۳۸۳	۳۲۲۹	توصیفی- مقطعي
جعفری (۴۰)	زنجان	۱۳۸۳	۴۵۱۰	تحلیلی- هم‌گروهی
شیوا رفعتی (۴۱)	تهران	۱۳۸۲	۴۶۰	تحلیلی- مورد شاهدی
نیلی (۴۲)	تهران	۱۳۸۱	۲۳۷۵	توصیفی- مقطعي
صغری کریمیان (۴۳)	قم	۱۳۷۹	۱۹۷۲	توصیفی- مقطعي
ضیاء اسلامی (۴۴)	بزد	۱۳۷۸	۵۱۲۱	توصیفی- مقطعي
کریم الله حاجیان (۴۵)	بابل	۱۳۷۷	۱۰۸۷	تحلیلی- مورد شاهدی
الهام خوری (۴۶)	گرگان	۱۳۷۵	۲۱۸۳	توصیفی- مقطعي




نمودار (۱): نسبت شانس سن مادر کمتر از ۱۹ سال با تولد نوزاد کم‌وزن و فاصله اطمینان ۹۵ درصدی آن در مطالعات موردبررسی بر اساس مدل اثرات تصادفی نقطه وسط هر پاره خط برآورد نسبت شانس و طول پاره خط فاصله اطمینان ۹۵ درصدی در هر مطالعه را نشان می‌دهد.
علامت لوزی نسبت شانس را برای کل مطالعات نشان می‌دهد.




نمودار (۲): نسبت شانس سن بالای ۳۰ سال مادر با تولد نوزاد کم‌وزن و فاصله اطمینان ۹۵ درصدی آن در مطالعات موردبررسی بر اساس مدل اثرات تصادفی نقطه وسط هر پاره خط برآورد نسبت شانس و طول پاره خط فاصله اطمینان ۹۵ درصدی در هر مطالعه را نشان می‌دهد.
علامت لوزی نسبت شانس را برای کل مطالعات نشان می‌دهد.




نمودار (۳): نسبت شانس وزن مادر با تولد نوزاد کم وزن و فاصله اطمینان ۹۵ درصدی آن در مطالعات مورد بررسی بر اساس مدل اثرات تصادفی. نقطه وسط هر پاره خط برآورد نسبت شانس و طول پاره خط فاصله اطمینان ۹۵ درصدی در هر مطالعه را نشان می‌دهد. علامت لوزی نسبت شانس را برای کل مطالعات نشان می‌دهد.




نمودار (۴): نسبت شانس سطح تحصیلات مادر با تولد نوزاد کم وزن و فاصله اطمینان ۹۵ درصدی آن در مطالعات مورد بررسی بر اساس مدل اثرات تصادفی. نقطه وسط هر پاره خط برآورد نسبت شانس و طول پاره خط فاصله اطمینان ۹۵ درصدی در هر مطالعه را نشان می‌دهد. علامت لوزی نسبت شانس را برای کل مطالعات نشان می‌دهد.



نمودار (۵): نسبت شانس شغل مادر با تولد نوزاد کم‌وزن و فاصله اطمینان ۹۵ درصدی آن در مطالعات موردبررسی بر اساس مدل اثرات تصادفی. نقطه وسط هر پاره خط برآورد نسبت شانس و طول پاره خط فاصله اطمینان ۹۵ درصدی در هر مطالعه را نشان می‌دهد. علامت لوزی نسبت شانس را برای کل مطالعات نشان می‌دهد.



نمودار (۶): نسبت شانس محل سکونت با تولد نوزاد کم‌وزن و فاصله اطمینان ۹۵ درصدی آن در مطالعات موردبررسی بر اساس مدل اثرات تصادفی. نقطه وسط هر پاره خط برآورد نسبت شانس و طول پاره خط فاصله اطمینان ۹۵ درصدی در هر مطالعه را نشان می‌دهد. علامت لوزی نسبت شانس را برای کل مطالعات نشان می‌دهد.



نمودار (۷): نمودار قیفی نسبت شانس محل سکونت با تولد نوزاد کم وزن

نوزادان کم وزن، وزن کمتر از ۵۰ کیلوگرم داشتند (۵۷) که با نتیجه مطالعه ما هم خوانی دارد. همچنین بر اساس یافته‌های مطالعه حاضر سطح تحصیلات مادر با تولد نوزاد کم وزن ارتباط معنی‌داری دارد به‌طوری‌که باسوان بودن مادر موجب کاهش تولد نوزاد کم وزن می‌گردد. در مطالعه فراتحلیل Sonia Silvestrin (۲۰۱۳) نشان داده شد سطح تحصیلات بالای مادر نقش پیشگیری کننده بر تولد نوزاد کم وزن دارد (۵۸) همچنین در مطالعه Aisha JALIL (۲۰۱۵) در پاکستان بی‌سواد بودن مادر موجب افزایش ۳/۵۹ برابر در تولد نوزاد کم وزن می‌گردید (۵۹). Domple و همکاران در هند (۲۰۱۶) نشان دادند سطح تحصیلات مادر با تولد نوزاد کم وزن ارتباط معنی‌داری دارد ($P=0.01$) (۵۰). به‌طوری‌که ۳۷/۵ درصد مادران نوزادان کم وزن بی‌سواد بودند اما حدود ۲۱/۲۵ درصد مادران نوزادان با وزن طبیعی بی‌سواد بودند (۵۴).

در مطالعه ما محل سکونت و شاغل بودن مادر موجب افزایش تولد نوزاد کم وزن می‌گردد ولی این رابطه از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد. در مطالعه Rengjiran و همکاران (۱۳۸۷) درصد از نوزادان مادران شاغل کم وزن بودند در صورتیکه در مادران خانه‌دار این میزان ۴/۶ درصد بود همچنین ۶/۸ درصد از نوزادانی که در منطقه شهری سکونت داشتند و ۶/۶ درصد از نوزادان ساکن روستا کم وزن بودند (۱۹). در مطالعات دیگر شاغل بودن مادر موجب افزایش تولد نوزاد کم وزن گردیده بود (۶۰). در مطالعه‌ای که توسط Domple و همکاران در هند (۲۰۱۶) انجام شد ۵۶/۸۸ درصد مادران نوزادان کم وزن در مناطق روستایی زندگی می‌کردند این میزان در نوزادان با وزن طبیعی ۵۲/۵ درصد بود. همچنین در این مطالعه بیشتر مادران نوزادان کم وزن خانه‌دار بودند که ارتباط معنی‌داری بین خانه‌دار بودن مادر با کم وزنی بدو تولد نوزادان آن‌ها وجود داشت (۵۴). اما در مطالعه Ghimire و همکاران (۲۰۱۴) و

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج حاصل از بررسی ۲۸ مطالعه شامل ۱۲ مطالعه مورد شاهدی با تعداد نمونه ۱۹۴۰۵، ۳ مطالعه هم‌گروهی با تعداد نمونه ۲۴۱۵۳ نشان ۵۴۳۰ و ۱۳ مطالعه توصیفی مقطعی با تعداد نمونه ۲۴۱۵۳ نشان داد، سن پایین مادر (کمتر از ۱۹ سال) موجب افزایش تولد نوزاد کم وزن می‌گردد در نتیجه با افزایش سن مادر میزان تولد نوزاد کم وزن کاهش یافته تا جایی که تأثیری بر تولد این نوزادان ندارد. طبق گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها سن زیر ۲۰ سال و بالای ۳۵ سال مادر با کم وزنی بدو تولد نوزادان ارتباط دارد (۴۷)، نتایج مطالعات انجام شده توسط اشرافیان و همکاران (۱۳۸۷) در تهران و مطالعه Velankar و همکاران (۲۰۰۹) در هند با یافته‌های مطالعه ما هم خوانی دارد (۴۸، ۳۰). در مطالعات انجام شده توسط Sutan و همکاران (۲۰۱۰)، Viengsakhone و همکاران (۲۰۱۴) و Bendhari و همکاران (۲۰۱۵)، Dalaal و همکاران (۲۰۱۵) و Ghimire و همکاران (۲۰۱۴) که به بررسی ارتباط سن مادر با تولد نوزادان کم وزن پرداخته بودند، ارتباط آماری معنی‌داری را گزارش نموده بودند (۴۹-۵۳) اگرچه در مطالعه Deshpande و همکاران (۲۰۱۱)، Domple و همکاران (۲۰۱۶) و Singh (۲۰۱۰) ارتباط آماری معنی‌داری بین سن مادر با نوزاد کم وزن مشاهده نشده (۵۴-۵۶). با توجه به مطالب مذکور سن مادر کمتر از ۱۹ سال یک عامل خطر برای افزایش تولد نوزاد کم وزن می‌باشد و به تعویق انداختن بارداری به سن پس از ۱۹ سال می‌تواند موجب کاهش تولد نوزاد کم وزن شود.

نتایج حاصل از فراتحلیل حاضر نشان داد وزن مادر ارتباط معنی‌داری با تولد نوزاد کم وزن دارد به‌طوری‌که با افزایش وزن بیش از ۵۰ کیلوگرم مادر، از تولد نوزادان کم وزن کاسته می‌شود. در مطالعه Kiran Agarwal (۲۰۱۱) در هند ۷۶/۱ درصد از مادران

بارداری، سن کمتر از ۱۹ سال مادر، سطح تحصیلات پایین مادر، شاغل بودن مادر و سکونت در منطقه شهری موجب افزایش تولد نوزاد کم وزن می‌گردد. با توجه به اینکه عوامل فوق قبل تعديل می‌باشند لذا پیشنهاد می‌گردد مسئولین بهداشتی با اجرای برنامه‌های مداخله‌ای مانند آموزش مادران در زمینه افزایش وزن مناسب قبل از بارداری و بارداری در سن مناسب، همچنین تشخیص نمودن مادران باردار از شغل خود تا پایان بارداری می‌توان از تولد نوزاد کم وزن پیشگیری نمود که خود موجب کاهش پیامدهای نامطلوب بعد از تولد و کاهش هزینه‌های بهداشتی و درمانی می‌گردد.

تشکر و قدردانی

بدینوسیله از معاونت پژوهشی و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام که ما را در انجام این مطالعه یاری نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌شود.

References:

- Adleshoar M. Factors predictive of underweight neonates in mothers that Referred to hospital in Rasht. (Dissertation). Rasht: Rasht University of Shahid Beheshti Nursing and Midwifery; 2005. (Persian)
- Qazijahan B. in translation pregnancy and childbirth. Williams (Autor) 22th Ed. Tehran: golestan press; 2005. (Persian)
- Hockenberry MJ, Wilson D. Wong's nursing care of infant and children Mosby Elsevire. 8th ed. 2007. P. 376-8.
- Golestan M, Fallah R, Karbasi S. "Neonatal mortality of low birth weight infants in Yazd, Iran. Med Iran J Reprod Med 2008;6(4): 205-8.
- Abasalti Z, Abrishami M, Poor FN. Prevalence of low birth weight infant's population covered in the province of Khorasan. The 9th Congress of Nutrition; 2005. (Persian)
- Safavi S, Muhammadi I. prevalence of anemia during pregnancy in 2001. The 9th Congress of Nutrition; 2003. (Persian)

Nagargoje و همکاران (۲۰۱۰) ارتباط آماری معنی‌داری بین محل سکونت با تولد نوزاد کم وزن مشاهده شد (۶۱، ۵۳). در مطالعه انجام شده توسط Deshpande و همکاران (۲۰۱۱)، Bendhari و همکاران Viengsakhone (۲۰۱۰) و Nagargoje و همکاران (۲۰۱۵) ارتباط معنی‌داری بین شغل مادر با تولد نوزاد کم وزن مشاهده شد (۴۹، ۵۱، ۵۵).

محدو دیت‌ها

محدو دیت‌های مطالعه شامل: ۱- عدم استفاده از پرسشنامه استاندارد و یکسان در مطالعات ۲- عدم طبقه‌بندی استاندارد و یکسان متغیرها در مطالعات ۳- کیفیت پایین برخی مطالعات که منجر به حذف آن‌ها از مطالعه گردید ۴- عدم همسان سازی و یا کنترل متغیرهای مخدوش کننده محیطی با استفاده از روش‌های آماری در برخی مطالعات ۵- وجود ناهمگونی بین مطالعات بودند. طبق یافته‌های حاصل از فراتحلیل حاضر وزن مادر در ابتدای

- Mirsalimi F, Sadeghi S. Maternal factors affecting low birth weight in educational and health centers affiliated to Iran Univ Med Sci. J Nurs Midwifery 2006;4: 22-9.
- Singh G, Chouhan R, Sidhu K. Maternal Factors for Low Birth Weight Babies. Med J Armed Forces India 2009;65(1):10-2.
- Grote N, Bridge J, Gavin A, Melville J, Iyengar S, Katon W. A meta-analysis of depression during pregnancy and the risk of preterm birth, low birth weight, and intrauterine growth restriction. Arch Gen Psychiatry 2010;67(10): 1012.
- Vaktskjold A, Tri D, Odland J, Sandanger T. Parity and birth weight in the Khanh Hoa Province, Vietnam. Open Women's Health J 2010;4: 1-4.
- Bernabé JVd, Soriano T, Albaladejo R, Juarranz M, Calle M, Martinez D. Risk factors for low birth weight: a review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004;116(1): 3-15.
- Bahrami N, Soleimani M, Rashvand F, Nia HS, Aboutorabi SHs, javadi ZHs. Association between seasonal patterns and birth weight. Koomesh 2012;13(4): 427-33.

13. Bazyar J, Daliri S, Sayehmiri K, Karimi A, Delpisheh A. Assessing the relationship between maternal and neonatal factors and low birth weight in Iran; a systematic review and meta-analysis. *J Med Life.* 2015;8(4): 23-31.
14. Karimi A, Daliri S, Miri KS. The relationship between violence during pregnancy and low birth weight: a meta-analysis study. *Hayat* 2016;22(3): 216-28.
15. Daliri S, Karimi A, SayehMiri K, Bazyar J, SayehMiri F. Assessing the Relationship between Some of Infant and Maternal Factors during Prior Pregnancies and Low Birth Weight in Iran: A Systematic Review and Meta- analysis. *IJOGI* 2016;19(31): 23-32.
16. Mondal B. Low Birth weight in relation to sex of baby, maternal age and parity: A hospital based study on tangsa tribe from Arunachal prades. *Indian med Assoc* 2002;96: 362-4.
17. Drkhshan RF, Nia MA, Sarvari ZZ. Study of pregnancy outcomes in women older first chidbirth. *Gilan Univ Med Sci* 2007;16(62): 426-47.
18. Elm EV, Altman D, Egger M, Pocock S, Gotzsche P, Vandebroucke J. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. *Prev Med* 2007;45(4): 247-51.
19. Ranjbaran M, JafaryManesh H, SajjadiHazaneh L, Eisaabadi S, Talkhabi S, Khoshniyat AS. Prevalence of Low Birth Weight and Some Associated Factors in Markazi Province. *World J Med Sci* 2015;12(3).
20. Mahmoodi Z, Karimloo M, Sajjadi H, Dejman M, Vameghi M, Dolatian M. Physical Activity Pattern and Personal-Social Factors of Mothers During Pregnancy And Infant Birth Weight Based On MET Scale: A Case-Control Study. *Iran Red Crescent Med J* 2013; 15(7): 573-80.
21. Chaman R, Amiri M, Raei M, Ajami M-E, Sadeghian A, Khosravi A. Low birth weight and its related risk factors in northeast iran .*Iran J Pediatr* 2013;23 (6): 701-4.
22. Davoudi N, Khezri M, Asgarpour M, Khatami S, Hoseinpour M, Azarian AA. Prevalence and Related Factors of Low Birth Weight in Mashhad, Iran. *Iran J Neonatol* 2012;3: 2.
23. Tayebi T, Zahrani ST, Mohammadpour R. Relationship between adequacy of prenatal care utilization index and pregnancy outcomes. *Iran J Nurs Midwifery Res* 2013;18: 5.
24. Bahrami N, Soleimani M. Study of Some Related Factors With Fetal Macrosomia and Low Birth Weight. *The J Urmia Nurs Midwifery Fac* 2014;12(2).
25. Fadaei B, Movahedi M, Akbari M, Ghasemi M, Jalalvand A. Effect of Maternal Age on Pregnancy Outcome. *J Isfahan Medical School* 2011;29(145).
26. Zarbakhsh MR, Hoseinian S, Afroz G, Hooman H. The Comparison Of Many Biological Characteristics, Economical Conditions, General Health(Mental), Of Mothers With Low And Normal Birth Weight At Gilan Province. *Paramedical J Tehran Univ Med Sci (Payavard health)* 2012;5(5).
27. Tabatabai S, Moradi M. Determining risk factors predictive of low birth weight infants born in Tehran 2007. *J School Nurs Midwifery Shahid Beheshti Univ Med Sci* 2010;20(71).
28. Nachvak SM, Jabari H, Ostadrahimi A, Djafarian K. Weight Gain During Pregnancy and Birth Weight Outcome In Pregnant Women, Tabriz, Iran. *J Health Res* 2012;1(1): 1.
29. Falah MH, Afroz G, Heidari G. Examining the factors effective on birth weight among babies of

- Yazd Province in 2007. J System Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2008;7(325):57–64.
30. Eshraghian F, Abolghasemi J, Ghafari J, Rajaei S. The Effects of Risk Factor of Pregnancy Period On Infant,s Weight. J Qazvin Univ of Med Sci 2008;11(4): 60-5.
31. Eftaekhar H, Aghahmolaie T, Abedini S. Risk factors associated with intrauterine growth retardation(IUGR) in infants Bandar Abbas. J Paiesh 2007;6(3).
32. Tootoonchi P. Low Birth Weight among Newborn Infants at TehranHospitals. Iran J Pediatr 2007;17(2).
33. Mirzarahimi M, HSeadati S, Chemische Berichteck M, Abasgholizadeh N, Azamie A, Enteshari T. The incidence and causes of low birth weight infants in the hospitals of Ardabil in year 2006. ScienceJ Ardabil Univ Med Sci 2009;9(1): 69-79.
34. Delaram M, Akbari N. Its weight gain during pregnancy with birth weight. Knowledge Health J 2007;3(2).
35. Vahdaninia M, Tavafian SS, Montazeri A. Correlates of low birth weight in term pregnancies: a retrospective study from Iran. BMC Pregnancy Childbirth 2008;8:12.
36. Eghbalian F. Low birth weight causes survey in neonates. Iran J Pediatr 2007;17(1).
37. Taheri F, Kazemi T. Risk Factors for Low Birth Weight in Birjand, Iran (a case-control study). Sci J Birjand Univ Med Sci 2006;14(3).
38. Roudbari M, Yaghmaei M, Soheili M. Perevalence and risk factors of low-birth- weight infant in zahedan, Islamic Republic Iran. La Revue de Sante de la Mediterranee orient 2007;13(4).
39. Sohrabi D, Asadi F. Some of the factors and consequences of low birth weight in nulliparous women in Vali Asr Hospital in Zanjan. Med J 2007;4(1).
40. Jafari F, Eftekhar H, Pourreza A, Mousavi J. Socio-economic and medical determinants of low birth weight in Iran: 20 years after establishment of a primary healthcare network. Public Health 2010;124(3):153–8.
41. Rafati S, Borna H, Akhavirad M, Fallah N. Maternal Determinants of Giving Birth to Low-Birth-Weight Neonates. J Iran Med. 2005;8(4).
42. Nili F, Rahmati MR, Sharifi SM. Maternal and neonatal outcome in teenage pregnancy in Tehran Valiasr Hospital. Acta Medica Iranica 2002;40(1):55–9.
43. Karimian S, Molamohamadi M, Jandaghi G. Prevalence and factors associated with low birth-weight babies in the maternity hospitals of Qom in 2000. J Feiz 2002;27.
44. Eslami Z, Aflatoonian A. The prevalence of low birth weight infants in Yazd. J Univ Med Sci Shahid Sadoughi Yazd 2001;10(2): 3.
45. Hajian K. The prevalence of low birth weight and some risk factors in Babol in 1998. J Zanjan Univ Med Sci 1999;10(26).
46. Khouri E, Vakili M, Golalipour M. The low birth weight in Gorgan and some related factors. ScienceJ Gorgan Univ Med Sci 2000;1(3-4).
47. Center for Disease Control and Perventation(CDC). National Center for Health Statisticies Vitalsat. 2010. Available at: <http://www.cdc.gov/nchs/VitalStats.htm>. 2010.
48. Velankar D. Maternal Factors Contributing to Low Birth Weight Babies in an Urban Slum Community of Greater Mumbai. Bombay Hos J 2009; 51(1): 26-35.
49. Viengsakhone L, Yoshida Y, Harun-Or-Rashid M, Sakamoto J. Factors affecting low birth weight at

- four central hospitals in Vientiane, Lao PDR. Nagoya J Med Sci 2010;72: 51-8.
50. Sutan R, Mohtar M, Mahat A, Tamil A. Determinant of low birth weight infants: A matched case control study. Open J Prev Med 2014;4: 91-9.
51. Bendhari M, Haralkar S. Study of maternal risk factors for low birth weight neonates: A case-control study. Int J Med Sci Public Health 2015;4: 987-90.
52. Dalal A, Chauhan S, Bala D. Epidemiological determinants of low birth weight in Ahmedabad city: A facility based case-control study. Int J Med Sci Public Health 2014;3: 430-2.
53. Ghimire R, Phalke D, Phalke V, Banjade B, Singh A. Determinants of low birth weight: A case control study in Pravara Rural hospital in Western Maharashtra, India. Int J Sci Res 2014;3: 243-5.
54. Domple VK, Doibale MK, Nair A, S P. Assessment of maternal risk factors associated with low birth weight neonates at a tertiary hospital, Nanded, Maharashtra. Niger Med J 2016 57(1): 37-43.
55. Deshpande J, Phalke D, Bangal V, Peeyuusha D, Bhatt S. Maternal risk factors for low birth weight neonates: A hospital based case-control study in rural area of Western Maharashtra, India. Natl J Community Med 2011;2: 394-8.
56. Singh S, Shrestha S, Marahatta S. Incidence and risk factors of low birth weight babies born in Dhulikhel hospital. J Inst Med 2010;32: 39-42.
57. Agarwal K, Agarwal A, Agrawal VK, Agrawal P, Chaudhary V. Prevalence and determinants of "low birth weight" among institutional deliveries. Ann Nigerian Med 2011;5(2).
58. Silvestrin S, b CHdS, Hirakatac VN, Goldanid AAS, Silveirab PP, Goldanie MZ. Maternal education level and low birth weight: a meta-analysis. J Pediatr (Rio J) 2013;89(4): 339-45.
59. Jalil A, Zakar R, Zakar MZ. A Secondary Analysis of Maternal Factors Determining Low Birth Weight in Pakistan. Iran J Public Health 2015;44(1): 136-7.
60. Meyer J, Nichols G, warren N, Reisine S. Maternal Occupation and Risk For low Birth weight Delivery: assessment using state birth registry Data. J Occup Environ Med 2008;50(3): 306-15.
61. Nagargoje M, Chaudhary S, Deshmukh J, Gupta S, Misra S. A case control study for risk factors of low birth weight in Nagpur city of Maharashtra. Indian J Community Health 2010;22: 4-7.

THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTHERS DEMOGRAPHIC FACTORS WITH LOW BIRTH WEIGHT IN IRAN: A META-ANALYSIS STUDY

Arezoo Karimi¹, Salman Daliri², Koorosh Sayehmiri^{3}, Ali Delpisheh⁴*

Received: 12 Dec 2016; Accepted: 06 Feb, 2017

Abstract

Background & Aims: The weight at birth is an important health indicator of infants. Underweight infant's birth is one of the major health problems and most fundamental causes of infant's death. This study was performed to determine the relation of mothers' demographic factors with underweight infant's birth as meta-analysis in Iran.

Materials and Methods: This study is a meta-analysis of mothers' demographic factors with underweight infant's birth in Iran, which was conducted on published articles in the country. In this aim by searching the information at SID, Medlib, Irandoc, Google scholar, Pubmed, ISI, Iranmedex, Scopus and Magiran, using key words and their compounds, all related articles were extracted independently by two trained researchers. The results of studies analyzed using the STATA and Spss20 software.

Results: In the initial searching of 49 articles, 28 articles met inclusion criteria for study. Mother's pre-pregnancy weight (OR: 2/28, CI%95: 1/42-5/61), and mother's job (OR: 1/15, CI%95: 0/72-1/84), respectively, has got the most and the least relation with the underweight infant's birth.

Conclusion: According to the results of the study, there is significant relationship between underweight infant's birth and mother's pre-pregnancy weight, mother's age under 19 years, mother's education and place of residence. Thus the control of mentioned risk factors in the mothers before the pregnancy can lead to the reduction of the underweight infant's birth.

Keywords: Iran, Low Birth Weight, mother's demographic factors, meta-analysis

Address: Kourosh Sayehmiri, Associate Professor of Biostatistics, Prevention Center of Social-Mental injuries, Ilam University of Medical Sciences, Iran

Tel: (+989183410782)

Email: sayehmiri@razi.tums.ac.ir

¹ The master of Epidemiology, Student Research Committee, Faculty of Health, Medical University of Ilam, Ilam, Iran

² The master of Epidemiology, Student Research Committee, Faculty of Health, Medical University of Ilam, Ilam, Iran

³ Associate Professor of Biostatistics, Prevention Center of Social-Mental injuries, School of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran. (Corresponding Author)

⁴ Professor of Clinical Epidemiology, Faculty of Medicine, Medical University of Ilam, Ilam, Iran