

بررسی فراوانی تداخل‌های دارویی شدید و متوسط در سالمندان تحت شیمی‌درمانی مبتلا به سرطان در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اردبیل در سال ۱۳۹۴

سیدیوسف لطفی^۱, آرام فیضی^{۲*}

تاریخ دریافت ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ تاریخ پذیرش ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

چکیده

پیش‌زمینه و هدف: سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است که افزایش برخی از بیماری‌های غیرواگیر از جمله سرطان‌ها جزء موارد قابل پیش‌بینی در آن است. سالمندان مبتلا به سرطان در اغلب موارد علاوه بر شیمی‌درمانی برای درمان دیگر بیماری‌ها و سندروم‌های همراه سرطان از داروهای متعددی استفاده می‌کنند که می‌تواند باعث افزایش احتمال تداخل دارویی، مسمومیت و عوارض جانبی گردد. هدف از مطالعه پیشرو بررسی شیوع تداخل‌های دارویی شدید و متوسط در سالمندان تحت شیمی‌درمانی مبتلا به سرطان و مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اردبیل می‌باشد.

مواد و روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی - مقطعی بر روی ۱۰۲ نفر از سالمندانی که در رده سنی ۶۰ سال و بالاتر قرار داشتند صورت گرفت. فهرستی از داروهای مصرفی بیمار با استفاده از پرونده پزشکی، همراهان و یا خود بیمار تهیه شده و با استفاده از نرم‌افزار تداخل‌های دارویی ورزن ۱، ۵، ۷، ۰ از نظر تداخل‌های دارویی شدید و متوسط و شروع اثر موربدبررسی قرار گرفت. اطلاعات حاصل وارد نرم‌افزار SPSS شده و در قالب آمار توصیفی ارائه شد.

یافته‌ها: فراوانی رخداد تداخل‌های دارویی در کل ۷۲/۵ درصد، تداخلات دارویی متوسط ۵۵/۹ درصد، تداخل‌های دارویی شدید ۱۶/۷ درصد و تداخل‌های دارویی شدید-متوسط ۱۶/۷ درصد به دست آمده، بیشترین فراوانی تداخل‌های دارویی بین دگزاماتازون و ابیتانت (۴۴/۱ درصد) بود. اکثر داروهای شیمی‌درمانی تجویز شده داروهای کمکی شیمی‌درمانی و داروهای مورداستفاده برای درمان بیماری همراه با وارفارین با سطح شدت شدید تداخل دارویی داشتند.

بحث و نتیجه‌گیری: با افزایش آگاهی علمی پرستاران و پزشکان از تداخل‌های دارویی، جایگزین کردن داروهای تداخل کننده با دیگر داروها در حد ممکن و با کاهش تعداد اقلام دارویی می‌توان از تعداد تداخل‌های دارویی و عاقبت ناشی از آن کاست.

کلیدواژه‌ها: سالمندی، سرطان، شیمی‌درمانی، تداخل‌های دارویی

مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره پانزدهم، شماره یازدهم، پی‌درپی، ۱۰۰، بهمن ۱۳۹۶، ص ۸۲۵-۸۱۵

آدرس مکاتبه: گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، نازلو، تلفن: ۰۱۴۱۵۲۰۵۰۱

Email: aramfeizi@yahoo.com

مقدمه

سال ۱۳۹۰، ۶۱۵۹۷۶ نفر است که ۸/۱ درصد از جمعیت عمومی را تشکیل می‌دهد^(۳). از آنجایی که میانگین سنی جمعیت رو به افزایش است افزایش برخی از بیماری‌های غیرواگیر از جمله سرطان‌ها جزء موارد قابل پیش‌بینی است^(۴). بر اساس آخرین بررسی‌های آماری و اپیدمیولوژیک در ایران، امروزه بعد از بیماری‌های قلبی - عروقی و حوادث، سرطان سومین عامل مرگ‌ومیر به حساب می‌آید^(۵). برآورد شده است که تا سال ۲۰۲۰ جمعیت جهان به ۷/۵ میلیارد نفر می‌رسد که از این تعداد ۱۵ میلیون نفر به سرطان مبتلا شده و ۱۲ میلیون نفر در جهان^(۶) و ۳۰۰ هزار نفر در ایران سالانه در اثر ابتلا به سرطان جان خود را

در بعد فردی، سالمندی دارای وجه باز زیست‌شناسختی است، که با عوارض گوناگون مانند تغییر در چهره و اندام، رنگ مو و سایر ارگان‌های فیزیولوژیک و حیاتی همراه است. بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سالمندی دوره‌ای از زندگی است که از پایان ۶۰ سالگی و آغاز ۶۱ سالگی شروع می‌شود^(۱). بر اساس این تعریف بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از جمعیت دنیا سالمند هستند و این رقم تا سال ۲۰۲۵ به ۲۰۲۵ به ۲ برابر خواهد رسید^(۲) این افزایش در کشورهای در حال توسعه بسیار شدیدتر از کشورهای توسعه‌یافته خواهد بود، جمعیت افراد بالای ۶۰ سال در ایران بر اساس آخرین سرشماری در

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

^۲ دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)

بیماران سالمند مبتلا به سرطان که تحت شیمی‌درمانی قرار می‌گیرند صورت گرفت.

مواد و روش کار

مطالعه مقطعی حاضر بر روی ۱۰۲ نفر از سالمندانی که در رده سنی ۶۰ سال و بالاتر قرار داشتند به منظور تعیین فراوانی تداخل‌های دارویی شدید و متوسط در سالمندان تحت شیمی‌درمانی در بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی اردبیل انجام پذیرفت. پرسشنامه تهیه شده برای جمع‌آوری اطلاعات دارویی و دموگرافیک بیمار شامل اطلاعات مربوط به سن، جنس، شغل، وضعیت انتیاد، آدرس محل سکونت، شماره پرونده، زمان شروع بیماری، نوع سرطان، بیماری همراه، داروهای شیمی‌درمانی، داروهای کمکی و داروهای مورداستفاده برای درمان بیماری‌های همراه می‌باشد. جمع‌آوری اطلاعات دموگرافیک بیمار با مراجعه به پرونده پزشکی و پرسش از خود بیمار و یا همراه بیمار، زمان تشخیص و نوع سرطان با مراجعه به برگه پاتولوژی و پرسش از خود بیمار و یا همراه بیمار، داروهای شیمی‌درمانی و داروهای کمکی بیمار با مراجعه به دستورات پزشکی پرونده بیمار و برای مشخص کردن نوع داروهای مورداستفاده برای درمان بیماری‌های همراه با تجویز پزشک از طریق پرسش از بیمار و همراه آگاه و در صورت به همراه داشتن داروها، داروهای مصرفی رؤیت گردیده و در صورت آگاه نبودن بیمار و یا به همراه نداشتن داروها از طریق پیامک و یا تماس تلفنی با بیمار نوع داروهای مصرفی مشخص گردید. بیماران مورد مطالعه دارای شرایط، سن بالای ۶۰ سال، تحت درمان بودن به صورت سرپایی، به همراه داشتن برگه پاتولوژی، تشخیص تومور جامد بدخیم، تحت شیمی‌درمانی بودن، ثبت داروهای شیمی‌درمانی در دستورات پزشکی پرونده بیمار، داشتن بیماری همراه، استفاده کردن دارو برای درمان بیماری همراه با تجویز پزشک و به همراه داشتن و یا آگاه بودن بیمار از داروهای مصرفی برای درمان بیماری‌های همراه وارد مطالعه شدند. سپس با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه، تداخلات دارویی شدید و متوسط از طریق نرم‌افزار تداخل‌های دارویی^۱ (ورژن ۷) موردنرسی قرار گرفت. در این نرم‌افزار داروها بر اساس حروف الفای انگلیسی مرتب شده‌اند و نوع تداخلات دارویی از نظر چگونگی آغاز (ناگهانی یا تأخیری)، شدت تداخل (کم، متوسط، شدید) تقسیم‌بندی شده‌اند. داروهایی که اسم آن‌ها در این نرم‌افزار آورده نشده‌اند بدون تداخل در نظر گرفته شدند. همچنین مکمل‌های تغذیه‌ای، سرمها و الکتروولیت‌ها موردنرسی قرار نگرفت. پس از تعیین تداخل‌های دارویی به منظور

از دست می‌دهند^(۷). رشد رو به افزایش تعداد مبتلایان به سرطان در سطح جهانی و نیز در کشور ما، آن را به عنوان یک معضل بهداشتی در سطح جهانی مطرح نموده و مبارزه با آن را جزء اولویت‌های بهداشتی درمانی قرار داده است^(۵).

امروزه شیمی‌درمانی یکی از روش‌های درمانی رو به گسترش است که به عنوان روشی پایه جهت درمان انواع اختلالات بدخیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد^(۸). اکثر بیماران تحت شیمی‌درمانی با طیف وسیعی از علائم و عوارض جانبی مانند تهوع، استفراغ، درد، بی‌خوابی، بی‌اشتهاای و خستگی مواجه می‌شوند^(۹). اغلب بیماران مبتلا به سرطان سالمند هستند که علاوه بر شیمی‌درمانی سرطان برای درمان بیماری‌های همراه مانند؛ بیماری‌های روماتولوژیک، گوارشی، قلبی عروقی و سندروم‌های همراه سرطان از قبیل تشنج، درد و ترمبوزهای وریدی از داروهای متعددی استفاده می‌کنند که می‌تواند باعث افزایش احتمال تداخل دارویی، مسمومیت و عوارض جانبی گردد^(۱۰).

۳۰-۲ درصد خطاهای دارویی مربوط به تداخل‌های دارویی است که در بیماران مسن مبتلا به سرطان این میزان به ۸۰ درصد افزایش یافته و اثرات نامطلوب غیرقابل برگشت ایجاد می‌کنند^(۱۱). محدوده این واکنش‌ها می‌تواند در طیف گسترده‌ای از عدم پاسخ به درمان تا وقوع اتفاقات جدی و خطرناک متغیر باشد هرچند نتیجه این تداخل می‌تواند مثبت (افزایش کارایی) و یا منفی (کاهش کارایی و سمیت) باشد ولی در دارودرمانی پیش‌بینی نشده و نامطلوب محاسب می‌گردد^(۱۲). بر اساس تقسیم‌بندی شدت تداخل‌های دارویی، تداخل دارویی متوسط باعث بدتر شدن وضعیت بالینی بیمار و تداخل دارویی شدید می‌تواند خدمات دائمی در ارگان‌های اصلی بدن بیمار ایجاد کرده و تهدیدکننده زندگی بیمار باشد^(۱۳) و از آنجاکه در کشور ما اندازه‌گیری سطوح خونی داروها در بیماران بهسادگی مقدور نمی‌باشد، اهمیت پیش‌بینی تداخل‌های دارویی و نحوه برخورد با آن‌ها دوچندان می‌شود^(۱۴).

با توجه به این که اطلاعات بسیار کمی در مورد فراوانی تداخل‌های دارویی در سالمندان تحت شیمی‌درمانی وجود دارد و نیز با توجه به اهمیت تداخل‌های دارویی و اثرات کاهش تداخل‌های دارویی در کاهش عوارض جانبی و نقش کلیدی پرستاران در پیشگیری از تداخل‌های دارویی، و همچنین فقدان شواهد پژوهشی در زمینه فراوانی تداخل‌های دارویی در بیماران تحت شیمی‌درمانی به نظر می‌رسد که انجام تحقیقی در این مورد ضروری باشد. لذا این مطالعه باهدف تعیین فراوانی تداخل‌های دارویی شدید و متوسط در

¹ Drug Interaction Facts

مطابق جدول (۳) در ۲۸ نفر معادل (۲۷/۵ درصد) از بیماران هیچ‌گونه تداخل‌های دارویی مشاهده نشده، در ۵۷ نفر معادل (۵۵/۹ درصد) از بیماران تداخل‌های دارویی متوسط، در ۱۷ نفر معادل (۱۶/۷ درصد) از بیماران هر دو تداخل‌های دارویی متوسط و شدید مشاهده شده و لازم به ذکر است که در هیچ‌یک از نمونه‌های مورد مطالعه تداخل‌های دارویی شدید به تنها مشاهده نشد و در بیمارانی که تداخل‌های دارویی شدید مشاهده شده تداخل‌های دارویی متوسط هم وجود داشته است. از نظر فروانی و زمان شروع اثر تداخلات دارویی شدید در نمونه‌های موردنظری مطابق جدول (۵) از ۱۰۲ نفر نمونه‌های موردمطالعه، ۸۵ نفر معادل (۸۳/۳ درصد) تداخل‌های دارویی شدید نداشتند، ۱۳ نفر معادل (۱۲/۷ درصد)، بین ۱-۲ تداخل‌های دارویی شدید و ۲ نفر معادل (۱/۹ درصد) بیشتر از ۴ تداخل‌های دارویی شدید داشتند که ۵ نفر معادل (۴/۹ درصد) تداخل‌های دارویی شدید با طول اثر سریع، ۹ نفر معادل (۸/۸ درصد) بین ۱-۲ تداخل‌های دارویی شدید با طول اثر تأخیر و ۲ نفر معادل (۱/۹ درصد) بیشتر از ۴ تداخل‌های دارویی شدید با طول اثر تأخیر داشتند. از نظر فروانی و زمان شروع اثر تداخلات دارویی متوسط در نمونه‌های موردنظری مطابق جدول (۶) از ۱۰۲ نفر نمونه‌های موردمطالعه، ۲۸ نفر معادل (۲۷/۵ درصد) تداخل‌های دارویی متوسط نداشتند، ۵۶ نفر معادل (۵۴/۹ درصد) بین ۱-۳ تداخل‌های دارویی متوسط و ۳ نفر معادل (۲/۹ درصد) بین ۷-۱۰ تداخل‌های دارویی متوسط و ۱ نفر معادل (۰/۹ درصد) بیشتر از ۱۰ تداخل‌های دارویی متوسط داشتند که ۳۸ نفر معادل (۳۷/۳ درصد) بین ۱-۲ تداخل‌های دارویی متوسط با طول اثر سریع، ۲ نفر معادل (۱/۹ درصد) بیشتر از ۴ تداخل‌های دارویی متوسط با طول اثر سریع، ۸ نفر معادل (۷/۸ درصد) بین ۴-۶ تداخل‌های دارویی متوسط با طول اثر تأخیر و ۱ نفر معادل (۰/۹ درصد) بین ۶-۱۰ تداخل‌های دارویی متوسط با طول اثر تأخیر داشتند. مطابق جدول (۷) در ۴۵ نفر معادل (۴۴/۱ درصد) تداخل دارویی بین دگرامتاژون و ابیتانت (شدت متوسط-طول اثر تأخیری) و ۶ نفر معادل (۵/۸ درصد) تداخل دارویی بین رانیتیدین و گلی بن گلامید (شدت متوسط-طول اثر تأخیر)، زلودا، سیسپلاتین، فلوروراسیل، پاکلیتاسل، جم زار تداخل دارویی با سایر داروها (اکثراً با وارفارین با شدت شدید) داشتند. از بین داروهای موردادستفاده وارفارین (با اکثر داروها)، دگرامتاژون، رانیتیدین، سایمتدین، فنی توئین، ابیتانت بیشترین تعداد تداخل دارویی داشتند. تداخل دارویی بین اکثر داروها با شدت متوسط و طول اثر تأخیری بود.

تجزیه و تحلیل آماری، اطلاعات به دست آمده وارد نرم‌افزار آماری SPSS شده و در قالب آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی پژوهش شامل:

۱. کسب مجوز از کمیته اخلاق
۲. محظمه نگهداری اطلاعات و نام افراد موردنظری
۳. در نظر گرفتن باورها، رفتارها و سنت‌های جامعه
۴. رعایت حرمت افراد و اجتماع هنگام بحث و تفسیر نتایج
۵. عدم استفاده از منابع مشکوک و فاقد اعتبار لازم
۶. رعایت صفات هنگام تجزیه تحلیل نتایج و عدم تحریف دستاوردها در جهتی که با خواسته‌های پژوهشگر همسو شود
۷. انتشار نتایج به زبان ساده به گونه‌ای که نتایج حاصله قابل استفاده کلیه متصدیان ذیربط باشد

یافته‌ها

مطابق جدول (۱) و با توجه به دسته‌بندی سن سالمندان تحت شیمی درمانی، ۶۰/۸ درصد (۶۲ نفر) از بیماران شرکت کننده در مطالعه بین گروه سنی ۶۰-۶۵ سال و ۵/۹ درصد (۶ نفر) بالای ۷۵ سال سن دارند و میانگین سنی آن‌ها $65/25 \pm 5/52$ می‌باشد. مطابق جدول (۲) از بین ۱۰۲ نفر شرکت کننده در مطالعه ۸۲ نفر معادل (۸۰/۴ درصد) مبتلا به بیماری قلبی عروقی (بیشترین فراوانی بیماری همراه در بین شرکت کنندگان در مطالعه) و ۳۸ نفر معادل (۳۷/۲ درصد) مبتلا به بیماری‌های غددی (بیشترین فراوانی بیماری همراه در بین شرکت کنندگان در مطالعه بعد از بیماری قلبی عروقی) و ۳ نفر معادل (۲/۹ درصد) مبتلا به اختلالات کبدی (کمترین فراوانی بیماری همراه در بین شرکت کنندگان در مطالعه) بودند. مطابق جدول (۴) بیشترین درصد فراوانی سرطان در مردان به ترتیب، سرطان معده (۱۳/۷ درصد)، سرطان ریه (۱۰/۷ درصد)، سرطان کولورکتال (۹/۷ درصد) و سرطان مری (۳/۹ درصد) و بیشترین فراوانی سرطان در زنان به ترتیب، سرطان سینه (۱۱/۷ درصد)، سرطان کولورکتال (۱۱/۷ درصد)، سرطان تخمدان (۵/۸ درصد)، سرطان معده (۵/۸ درصد) و سرطان مری (۵/۸ درصد) می‌باشد، در زنان سرطان مثانه و لتفوم گردنی و در مردان سرطان حنجره، زبان، پوست، میوسارکوم و تومور بدخیم چشمی مشاهده نشده است. میزان بروز سرطان پانکراس در زن و مرد برابر و میزان بروز سرطان معده و ریه در مردان بیشتر از زنان و میزان بروز سرطان مری و کبد در زنان بیشتر از مردان می‌باشد، بیشترین محل بروز سرطان دستگاه گوارش در زنان به ترتیب، کولورکتال، معده و مری (با درصد فراوانی برابر) و در مردان به ترتیب، معده و کولورکتال می‌باشد. از نظر فراوانی تداخلات دارویی در نمونه‌های موردنظری

جدول (۱): بررسی مشخصات جمعیت شناختی کمی نمونه‌های شرکت‌کننده در پژوهش

انحراف معیار	میانگین	درصد	تعداد	گروه سنی
		۶۰/۸	۶۲	۶۰-۶۵
		۲۲/۵	۲۳	۶۵-۷۰
۵/۵۲	۶۵/۲۵	۱۰/۸	۱۱	۷۰-۷۵
		۵/۹	۶	>۷۵
		۱۰۰	۱۰۲	

جدول (۲): بررسی بیماری‌های همراه در بین نمونه‌های شرکت‌کننده در پژوهش

متغیر	تعداد	درصد
بیماری قلبی عروقی	۸۲	۸۰/۴
	۲۰	۱۹/۶
بیماری ریوی	۱۰	۹/۸
	۹۲	۹۰/۲
بیماری‌های غددی	۳۸	۳۷/۳
	۶۴	۶۲/۷
اختلالات کبدی	۳	۲/۹
	۹۹	۹۷/۱
بیماری ادراری تناسلی	۱۱	۱۰/۸
	۹۱	۸۹/۲
اختلالات عصبی	۱۸	۱۷/۶
	۸۴	۸۲/۴
مجموع	۱۰۲	۱۰۰

جدول (۳): بررسی تداخل‌های دارویی در نمونه‌های موردپژوهش

تداخلات دارویی	تعداد	درصد
عدم تداخل‌های دارویی	۲۸	۲۷/۵
تداخل‌های دارویی متوسط	۵۷	۵۵/۹
تداخل‌های دارویی شدید	۱۷	۱۶/۷
تداخل‌های دارویی متوسط-شدید	۱۷	۱۶/۷
مجموع	۱۰۲	۱۰۰

جدول (۴): تشخیص نوع سرطان در نمونه‌های موردمطالعه

نوع سرطان	فراآنی مبتلا به سرطان در جنس زن	در رصد مبتلا به سرطان در جنس زن	فراآنی مبتلا به سرطان در جنس مرد	در رصد مبتلا به سرطان در جنس مرد
ريه	۵	۴/۹	۱۱	۱۰/۷
معده	۶	۵/۸	۱۴	۱۳/۷
تخدمان	۶	۵/۸	۰	۰
کولورکتال	۱۲	۱۱/۷	۱۰	۹/۷
سینه	۱۲	۱۱/۷	۰	۰
مری	۶	۵/۸	۴	۳/۹
متانه	۰	۰	۱	۰/۹
تومور بدخیم چشمی	۱	۰/۹	۰	۰
تومور کبد	۳	۲/۹	۱	۰/۹
پروستات	۰	۰	۲	۱/۹
حنجره	۱	۰/۹	۰	۰
لنفوم گردانی	۰	۰	۱	۰/۹
پانکراس	۱	۰/۹	۱	۰/۹
میوساکروم	۱	۰/۹	۰	۰
زبان	۱	۰/۹	۰	۰
پوست	۱	۰/۹	۰	۰
مجموع	۵۶	۵۴	۴۵	۴۳/۵

جدول (۵): بررسی فراوانی و زمان شروع تداخل‌های دارویی شدید در نمونه‌های موردمطالعه

تداخل‌های دارویی شدید و زمان شروع اثر	تعداد تداخل‌های دارویی	تعداد	درصد
تداخل‌های دارویی شدید	۱-۲	۱۲/۷	۸۳/۳
تداخل‌های دارویی شدید	۳-۴	۲	۱/۹
تداخل‌های دارویی شدید	>۴	۲	۱/۹
تداخل‌های دارویی شدید-سریع	۰	۹۷	۹۵/۱
تداخل‌های دارویی شدید-تاخیر	۱-۲	۹	۸/۸
تداخل‌های دارویی شدید-تاخیر	۳-۴	۲	۱/۹
تداخل‌های دارویی شدید-تاخیر	>۴	۲	۱/۹
مجموع	۱۰۲	۱۰۰	

جدول (۶) بررسی فراوانی و زمان شروع تداخل‌های دارویی متوسط در نمونه‌های موردمطالعه

درصد	تعداد	تعداد تداخل‌های دارویی	تداخل‌های دارویی متوسط و زمان شروع اثر
۲۷/۵	۲۸	.	تداخل‌های دارویی متوسط
۵۴/۹	۵۶	۱-۳	
۱۳/۷	۱۴	۴-۶	
۲/۹	۳	۷-۱۰	
۰/۹	۱	>۱۰	
۵۹/۸	۶۱	.	تداخل‌های دارویی متوسط-سریع
۳۷/۳	۳۸	۱-۲	
۰/۹	۱	۳-۴	
۱/۹	۲	>۴	
۹۱/۲	۹۳	<۳	تداخل‌های دارویی متوسط-تأخیر
۷/۸	۸	۴-۶	
۰/۹	۱	۶-۱۰	
۱۰۰	۱۰۲	مجموع	

جدول (۷): بررسی تداخل‌های دارویی بین داروهای شیمی‌درمانی، داروهای کمکی و داروهای مورداستفاده برای درمان بیماری همراه

درصد	فراوانی	شروع اثر	شدت	تداخل‌های دارویی
۰/۹	۱	تأخیری	شدید	وارفارین+پاکلیتاکسل
۰/۹	۱	تأخیری	شدید	وارفارین+اتاکسال
۰/۹	۱	تأخیری	شدید	وارفارین+زلودا
۰/۹	۱	تأخیری	شدید	وارفارین+جم زار
۰/۹	۱	تأخیری	شدید	پنتوپرازول+پلاوبیکس
۰/۹	۱	تأخیری	شدید	وارفارین+فلوروراسیل
۰/۹	۱	تأخیری	شدید	وارفارین+سایمتیدین
۴۴/۱	۴۵	تأخیری	متوسط	دگزامتاژون+ابیتانت
۱/۹	۲	تأخیری	متوسط	دیازپام+ابیتانت
۳/۹	۴	تأخیری	متوسط	کلرودیازپوكساید+ابیتانت
۰/۹	۱	سریع	متوسط	پروزاک+پتیدین
۱/۹	۲	سریع	متوسط	سایمتیدین+پروپرانول
۵/۸	۶	تأخیری	متوسط	رانیتیدین+گلی بن گلامید
۳/۹	۴	تأخیری	متوسط	هیدروکورتیزون+ابیتانت
۴/۹	۵	تأخیری	متوسط	وارفارین+دگزامتاژون
۰/۹	۱	تأخیری	متوسط	دبگوگسین+پنتوپرازول
۰/۹	۱	سریع	متوسط	سفالکسین+رانیتیدین
۱/۹	۲	تأخیری	متوسط	کلوفناتیام+ابیتانت
۲/۹	۳	تأخیری	متوسط	دگزامتاژون+فلوکونازول
۰/۹	۱	تأخیری	متوسط	پنتوپرازول+تولترودین

درصد	فراوانی	شروع اثر	شدت	تداخل‌های دارویی
۲/۹	۴	تأخری	متوسط	وارفارین+ابیتانت
۰/۹	۱	تأخری	متوسط	سیس پلاتین+انداسترون
۰/۹	۱	تأخری	متوسط	وارفارین+استامینوفون
۲/۹	۴	سریع	متوسط	لازیکس+سیس پلاتین
۰/۹	۱	سریع	متوسط	سایمتدین+متفورمین
۰/۹	۱	تأخری	متوسط	پروماتازین+کلیدنیوم
۴/۹	۵	تأخری	متوسط	آپرازولام+ابیتانت
۰/۹	۱	سریع	متوسط	متپروولول+سایمتدین
۰/۹	۱	تأخری	متوسط	فلوروراسیل+فنی توئین
۱/۹	۲	سریع	متوسط	پروماتازین+کاپتوپریل
۰/۹	۱	تأخری	متوسط	سیس پلاتین+فنی توئین
۰/۹	۱	تأخری	متوسط	سیس پلاتین+والپروئیک اسید
۰/۹	۱	تأخری	متوسط	دگرامتاژون+فنی توئین
۰/۹	۱	تأخری	متوسط	فلوروراسیل+سایمتدین
۰/۹	۱	تأخری	متوسط	استامینوفون+فنی توئین
۰/۹	۱	تأخری	متوسط	فلوروراسیل+هیدروکلوروکلیزاید

متوسط ۵۹/۶۵ درصد می‌باشد که با مطالعه حاضر هم‌خوانی دارد(۱۳). راشل^۲ و همکاران (۲۰۰۷) در مطالعه‌ای باهدف بررسی تداخل‌های دارویی بالقوه و تجویز تکراری دارو در سالمندان مبتلا به سرطان نشان داد، تداخل‌های دارویی شدید ۹ درصد و تداخل‌های دارویی متوسط ۷۷ درصد می‌باشد که در مقایسه با مطالعه حاضر درصد فراوانی تداخل‌های دارویی شدید کمتر و تداخل‌های دارویی متوسط بیشتری دارد، به علت تجویز کمتر داروهایی در محدوده سطح تداخل‌های دارویی شدید، درصد فراوانی تداخل‌های دارویی شدید کمتر و به علت استفاده بیشتر از داروهایی با سطح تداخل متوسط مانند آسپرین با بتاپلوكره، آسپرین با کورتیکواستروئید، وارفارین با کورتیکواستروئید و وارفارین با فلوروراسیل، درصد فراوانی تداخل‌های دارویی متوسط بیشتری نسبت به مطالعه حاضر دارد(۱۶).

مطالعه حاضر نشان داد بیشترین فراوانی تداخل‌های دارویی، بین دگرامتاژون و ابیتانت (۴۴/۱ درصد) می‌باشد. از بین داروهای شیمی‌درمانی تجویز شده، زلودا، سیس پلاتین، فلوروراسیل، پاکلیتاكسل، جمزار تداخل‌های دارویی با سایر داروها (اکثراً با وارفارین با شدت شدید) داشتند. از بین داروهای مورداستفاده

بحث و نتیجه‌گیری

مطالعه حاضر نشان داد، عدم تداخل دارویی ۲۷/۵ درصد، تداخل دارویی متوسط ۵۵/۹ درصد، تداخل دارویی شدید ۱۶/۷ درصد و تداخل دارویی متوسط - شدید ۱۶/۷ درصد می‌باشد. همسو با نتایج این مطالعه، مارتین^۱ و همکاران (۲۰۰۹) در مطالعه‌ای باهدف بررسی تداخل‌های دارویی در سالمندان مبتلا به سرطان نشان داد، از ۲۴۷ تداخل‌های دارویی مشاهده شده، تداخل‌های دارویی شدید - متوسط ۴۷/۶ درصد و تداخل‌های دارویی شدید ۰/۸ درصد می‌باشد که در مقایسه با مطالعه حاضر درصد فراوانی تداخل‌های دارویی متوسط - شدید بالا و تداخل‌های دارویی شدید پایین می‌باشد. علل بالا بودن درصد فراوانی تداخل‌های دارویی متوسط - شدید، احتمالاً بالا بودن میانگین سنی بیماران (۷۴/۲ سال) و مصرف تعداد اقلام دارویی بیشتر و علت پایین بودن درصد فراوانی تداخل‌های دارویی شدید، تجویز کمتر داروهایی در محدوده سطح تداخل‌های دارویی شدید نسبت به مطالعه حاضر می‌باشد(۱۵). توکلی و همکاران (۲۰۱۳) در مطالعه‌ای باهدف بررسی فراوانی تداخل‌های دارویی بالقوه و عوامل خطر مرتبط با آن در سالمندان مبتلا به سرطان در یک کشور توسعه یافته نشان داد، تداخل‌های دارویی شدید ۱۴۰/۳ درصد و تداخل‌های دارویی

² Rachel

¹ Martin

همکاران (۲۰۱۱) در مطالعه‌ای باهدف بررسی تداخل‌های و واکنش‌های نامطلوب دارویی در بیماران تحت درمان در انکولوژی نشان داد، در بین داروهای تجویزشده در بیماران تحت شیمی‌درمانی وارفارین، کاپتوپریل، عوامل ضدالتهاب و ضد تشنج بیشترین تداخل‌های دارویی را با سایر داروها و عوامل شیمی‌درمانی دارند که در مطالعه حاضر هم وارفارین، دگراماتازون و فنی‌تؤین تعداد تداخل‌های دارویی بیشتری دارند بنابراین این مطالعه با مطالعه حاضر هم‌خوانی دارد.^(۱۸)

مطالعه حاضر نشان داد، شایع‌ترین سرطان در مردان به ترتیب، سرطان معده (۱۳/۷ درصد)، سرطان ریه (۱۰/۷ درصد)، سرطان کولورکتال (۹/۷ درصد) و سرطان مری (۳/۹ درصد) و شایع‌ترین سرطان در زنان به ترتیب، سرطان سینه (۱۱/۷ درصد)، سرطان کولورکتال (۱۱/۶ درصد)، سرطان تخمدان (۵/۸ درصد)، سرطان معده (۵/۸ درصد) و سرطان مری (۵/۸ درصد) می‌باشد. بیشترین محل بروز سرطان دستگاه گوارش در زنان به ترتیب، کولورکتال، معده و مری (با درصد فراوانی برابر) و در مردان به ترتیب، معده و کولورکتال می‌باشد.

همسو با نتایج این مطالعه، صومی^۴ و همکاران (۲۰۰۸) در مطالعه‌ای باهدف بررسی همه‌گیری سرطان‌های دستگاه گوارش در سالمندان استان آذربایجان شرقی نشان داد، شایع‌ترین سرطان دستگاه گوارش در مردان بالای ۶۵ سال سرطان معده است که با مطالعه حاضر هم‌خوانی دارد و شایع‌ترین سرطان دستگاه گوارش در زنان بالای ۶۵ سال سرطان مری می‌باشد.^(۱۹) که با مطالعه حاضر هم‌خوانی ندارد به طوری که در مطالعه حاضر شایع‌ترین سرطان دستگاه گوارش در زنان بالای ۶۵ سال سرطان کولورکتال می‌باشد که علت این تفاوت می‌تواند ناشی از بالا بودن عوامل خطر سرطان کولورکتال در محیط پژوهش (استان اردبیل) مانند افزایش مصرف کربوهیدرات‌ها و چربی‌ها و کاهش مصرف فیبر بهویژه در جوانان، تغییر سبک زندگی، عدم تحرک کافی و چاقی، جوان بودن اکثریت افراد جامعه و احتمالاً دخالت مسائل ژنتیکی باشد.^(۲۰)

نتایج مطالعه حاضر نشان داد، بیماری قلبی عروقی (۸۰/۴ درصد) بیشترین درصد فراوانی بیماری همراه در بین سالمندان تحت شیمی‌درمانی می‌باشد.

لمکات^۵ و همکاران (۲۰۰۹) در مطالعه‌ای باهدف بررسی تداخل‌های دارویی فارماکوکنیتیک تحت تأثیر انتشار داروهای ضد توموری در بیماران مسن مبتلا به سرطان نشان داد، بیماری قلبی عروقی شایع‌ترین بیماری مزمن در بیماران مسن مبتلا به سرطان

وارفارین (با اکثر داروها)، دگراماتازون، رانیتیدین، سایمتدين، فنی تؤین، ابیتانت بیشترین تعداد تداخل‌های دارویی داشتند.

همسو با نتایج مطالعه حاضر، راشل و همکاران (۲۰۰۷) در مطالعه‌ای باهدف بررسی تداخلات دارویی بالقوه و تجویز تکراری دارو در سالمندان مبتلا به سرطان، در نتایجی از تداخل‌های دارویی داروهای شیمی‌درمانی با دیگر داروها نشان داد، تداخل‌های دارویی بین وارفارین با فلوروراسیل، کربوپلاتین، پاکلی‌تاکسل و جمزار ۳/۷ که در مطالعه حاضر ۳/۶ می‌باشد، تداخل‌های دارویی بین، انداسترون و سیس‌پلاتین ۰/۹ در مطالعه حاضر نیز ۰/۹، سیس‌پلاتین با فنی‌تؤین ۰/۲ در مطالعه حاضر ۰/۹، فلوروراسیل با سایمتدين ۰/۲ فنی‌تؤین ۰/۲ در مطالعه حاضر ۰/۹، فلوروراسیل با هیدروکلروتیازید ۱/۴ در مطالعه حاضر ۰/۹ و سیس‌پلاتین با لازیکس ۰/۲ که در مطالعه حاضر ۳/۹ می‌باشد. در نتایجی از تداخل‌های دارویی بین داروهای کمکی شیمی‌درمانی با دیگر داروها نشان داد، وارفارین با استامینوفن ۰/۰ در مطالعه حاضر نیز ۰/۹، وارفارین با دگراماتازون ۱/۴ در مطالعه حاضر ۴/۹ و فنی‌تؤین با دگراماتازون ۳/۱ در مطالعه حاضر ۰/۹ می‌باشد.^(۱۶) توکلی و همکاران (۲۰۱۳) در مطالعه‌ای باهدف بررسی فراوانی تداخل‌های دارویی بالقوه و عوامل خطر مرتبط با آن در سالمندان مبتلا به سرطان در یک کشور توسعه یافته، در نتایجی از تداخل‌های بین داروهای شیمی‌درمانی با دیگر داروها نشان داد، سیس‌پلاتین با لازیکس (۸/۴) بیشترین فراوانی تداخل‌های دارویی بین داروهای شیمی‌درمانی با دیگر داروها را دارد که با مطالعه حاضر هم‌خوانی دارد با این تفاوت که درصد فراوانی لازیکس با سیس‌پلاتین در مطالعه توکلی در مقایسه با مطالعه حاضر (لازیکس با سیس‌پلاتین ۳/۹) بالا می‌باشد علت این تفاوت می‌تواند تجویز بیشتر لازیکس یا سیس‌پلاتین یا بالا بودن جامعه آماری نسبت به مطالعه حاضر باشد. در مطالعه توکلی منیزیوم هیدروکسید با دگراماتازون بیشترین فراوانی تداخلات دارویی بین داروهای کمکی شیمی‌درمانی با دیگر داروها را دارد، که با مطالعه حاضر هم‌خوانی ندارد چون در مطالعه حاضر ابیتانت با دگراماتازون (۴۴/۱ درصد) بیشترین فراوانی تداخل‌های بین داروهای کمکی شیمی‌درمانی با دیگر داروها را دارد.^(۱۳) راشل و همکاران (۲۰۰۸) در مطالعه‌ای باهدف بررسی تداخل‌های دارویی در بیماران مسن مبتلا به سرطان نشان داد، وارفارین در بین داروهای تجویزشده بیشترین تداخل‌های دارویی را با سایر داروها دارد که نتیجه این مطالعه مشابه با مطالعه حاضر می‌باشد.^(۱۷) میراندا^۳ و

³ Miranda

⁴ Soumi

گزارش نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر در مورد داروهای پرتداخل می‌توان منجر به کاهش تداخل‌های دارویی و درنتیجه افزایش کیفیت مراقبت و امنیت بیمار شد.

پس از انجام این پژوهش و با توجه به یافته‌های آن توصیه می‌گردد:

- این پژوهش علاوه بر بیماران مسن می‌تواند در سایر گروه‌های سنی هم انجام گیرد.

- این پژوهش علاوه بر بیماران سرپاپی تحت شیمی‌درمانی می‌تواند در بیماران بستری در بخش شیمی‌درمانی هم انجام گیرد.

- این پژوهش می‌تواند با بررسی عوارض حاد ناشی از تداخل‌های دارویی در بیماران تحت شیمی‌درمانی انجام گیرد.

- این پژوهش علاوه بر بررسی تداخل‌های دارویی در بیماران مبتلا به تومور بدخیم جامد در بیماران مبتلا به سرطان خون و لنف نیز صورت گیرد.

- این پژوهش علاوه بر بررسی تداخل‌های دارویی در بخش شیمی‌درمانی می‌تواند باهدف بررسی خطاهای دارویی توسط پرستاران صورت گیرد

تشکر و قدردانی

برخود واجب می‌دانم کمال تشکر را از استاد محترم جناب آقای دکتر آرام فیضی که نتایج کارم را مرهون زحمات و راهنماییهای ایشان در تمام مراحل پژوهش می‌دانم ابراز دارم.
از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، بیماران و همکاران پرستار بخش بستری و سرپاپی شیمی‌درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل و همچنین تشکر ویژه از جناب آقای دکتر دادخواه و دکتر کنی که در طول اجرای پژوهش سعادت بهره‌مندی از دانش و معرفت آن‌ها نصیب گردیده است صمیمانه قدردانی نمایم.

می‌باشد که با مطالعه حاضر هم‌خوانی دارد (۲۱). همسو با نتایج این مطالعه، پیمان و همکاران (۱۳۹۰) در مطالعه‌ای باهدف تعیین فراوانی بیماری‌های مزمن در سالمندان شهر ایلام نشان داد، بیماری قلبی عروقی (۸۹/۸ درصد) شایع‌ترین بیماری مزمن در سالمندان می‌باشد که با مطالعه حاضر هم‌خوانی دارد (۲۲)

درنهایت می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که در سالمندان تحت شیمی‌درمانی میزان کلی وقوع تداخل‌های دارویی بالقوه ۷۲/۵ درصد، تداخل‌های دارویی شدید ۱۶/۷ درصد و تداخل‌های دارویی متوسط ۵۵/۹ درصد می‌باشد و عواملی از قبیل بالا بودن میزان بروز بیماری همراه در سالمندان و به دنبال آن افزایش مصرف تعداد اقلام دارویی، استفاده از داروهایی برای کنترل عوارض حاد شیمی‌درمانی و داروهای شیمی‌درمانی می‌تواند بر این میزان اثرگذار باشد. اگرچه که همه‌ی تداخل‌های دارویی بالقوه بهصورت تداخل‌های بالفعل خود را نشان نمی‌دهند ولی میزان بالای وقوع تداخل‌های دارویی بالقوه و آسیب‌پذیر بودن سالمندان تحت شیمی‌درمانی به دلیل تغییرات فیزیولوژیک دوران سالمندی و تأثیر منفی داروهای شیمی‌درمانی روی ارگان‌های اصلی بدن می‌تواند زنگ خطری در رابطه با وقوع تداخل‌های دارویی واقعی و عوارض شدید، حاد و غیرقابل جبران در بیماران سالمند تحت شیمی‌درمانی گردد، و اقداماتی در جهت پیشگیری از تداخل‌های دارویی با افزایش آگاهی علمی دارویی، پرسنل درمانی بهخصوص پزشکان و پرستاران از تداخل‌های دارویی، جایگزین کردن داروهای تداخل کننده با دیگر داروها در حد ممکن، کاهش تعداد اقلام دارویی و استفاده از اقدامات غیر دارویی برای کنترل عوارض حاد شیمی‌درمانی مانند، استفاده از فن‌های آرام‌سازی، موسیقی‌درمانی، تجسم هدایتشده، رعایت مرتبت بهداشت دهان، وعده‌های غذایی متعدد و به مقدار کم و مصرف غذاهای بدون حرک برای کاهش تهوع استفراغ، و درنهایت با

References:

1. Seyed MSM. Some observations on the dimensions of aging with a look at Japan's experience. *J Hum Sci* 2007; 53:201–22.
2. Organization WH. World Health Organization launches new initiative to address the health needs of a rapidly ageing population. Retrieved November. 2004; 22: 2014.
3. Statistical Center of Iran. Selected Findings of National Population and Housing Census, 2011.
- [Internet]. 2012. Available from:
<https://www.amar.org.ir/Portals/1/Iran/90.pdf>
4. Rafee M, Akbari M, Alizade M, Eshrat B, Hatami H. The role of geographically distributed on the incidence of survival in elderly with cancer in Iran. Payesh 2011.
5. Davari M, Moafi A, Yarmohammadian M, Khayyamhaghghi E. The Direct Medical Costs of Acute Lymphocytic Leukemia (ALL) In Children in Isfahan Province. *Health Inf Manage* 2014;11(7): 1047-57.

6. Bray F, Møller B. Predicting the future burden of cancer. *Nature Rev Cancer* 2006;6(1): 63-74.
7. Marjani A, Kabir M. Breast cancer incidence among females in the Golestan province, Iran. *Indian J Cancer* 2009;46(4): 351-2.
8. Network NCC. Standards of care and management of distress penal. Distress management version 2007;1.
9. Henry DH, Viswanathan HN, Elkin EP, Traina S, Wade S, Cella D. Symptoms and treatment burden associated with cancer treatment: results from a cross-sectional national survey in the US. *Support Care Cancer* 2008;16(7): 791-801.
10. Blower P, de Wit R, Goodin S, Aapro M. Drug-drug interactions in oncology: why are they important and can they be minimized? *Crit Rev Oncol Hematol* 2005;55(2):117-42.
11. Beijnen JH, Schellens JH. Drug interactions in oncology. *Lancet Oncol* 2004;5(8): 489-96.
12. Krähenbühl-Melcher A, Schlienger R, Lampert M, Haschke M, Drewe J, Krähenbühl S. Drug-related problems in hospitals. *Drug Safety* 2007;30(5): 379-407.
13. Tavakoli-Ardakani M, Kazemian K, Salamzadeh J, Mehdizadeh M. Potential of drug interactions among hospitalized cancer patients in a developing country. *Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR* 2013;12(Suppl): 175.
14. Rafeian M. Drug interactions in internal and surgical wards of Kashani Hospital, Shahrekord, 1997. *Tehran Univ Med J* 2001;59(4): 86-91.
15. Puts MT, Costa-Lima B, Monette J, Girre V, Wolfson C, Batist G, et al. Medication Problems in Older, Newly Diagnosed Cancer Patients in Canada: How Common are They? *Drugs Aging* 2009;26(6): 519-36.
16. Riechelmann RP, Tannock IF, Wang L, Saad ED, Taback NA, Krzyzanowska MK. Potential drug interactions and duplicate prescriptions among cancer patients. *J Natl Cancer Inst* 2007;99(8): 592-600.
17. Riechelmann RP, Zimmermann C, Chin SN, Wang L, O'Carroll A, Zarinehbaf S, et al. Potential drug interactions in cancer patients receiving supportive care exclusively. *J Pain Symptom Manag* 2008;35(5): 535-43.
18. Miranda V, Fede A, Nobuo M, Ayres V, Giglio A, Miranda M, et al. Adverse drug reactions and drug interactions as causes of hospital admission in oncology. *J Pain Symptom Manag* 2011;42(3): 342-53.
19. Soumi M, Rezaifar P, Naghashi S. The epidemiology of gastrointestinal cancers in elderly of east-azerbaijan province (2006). *Salmand* 2008;3(8):589-95.
20. Moshfeghi K, Mohammad-Beigi A, Hamedani Sanani D, Bahrami M. Evaluation the role of nutritional and individual factors in colorectal cancer. *Zahedan J Res Med Sci* 2011;13(4): 12-7.
21. Lemachatti J, Leveque D, Beretz L, Bergerat JP. Potential pharmacokinetic interactions affecting antitumor drug disposition in cancer patients. *Anticancer Res* 2009;29(11): 4741-4.
22. Peiman H, Delpishe A. Prevalence of chronic diseases in the elderly in Ilam. *Iran J Age* 2012;6(4): 7-13.

A SURVEY ON THE FREQUENCY OF MODERATE AND SEVERE DRUG INTERACTIONS AND DURING OPERATION AMONG ELDERLY PATIENTS WITH CANCER UNDER CHEMOTHERAPY REFERRED TO IMAM KHOMEINI HOSPITAL, ARDEBIL 2015-16

*Yosef Lotfi¹, Aram Feizi^{*2}*

Received: 19 Sep, 2017; Accepted: 28 Nov, 2017

Abstract

Background & Aims: Ageing critical period of human life is the increasing number of non-communicable diseases such as cancers are predictable cases. In most cases Elderly Patients with cancer addition to cancer chemotherapy for the treatment of diseases and syndromes associated with cancer of various medicines that can increase the likelihood of drug interactions, toxicity and side effects are. The aim of leading the prevalence of moderate and severe drug interactions in the elderly undergoing chemotherapy in cancer patients referred to Imam Khomeini hospital in Ardebil.

Materials & Methods: Cross - sectional study on 102 elderly people who are aged 60 years and older was conducted. A list of medications the patient by using medical records, relatives and patient himself prepared, Drug-drug interactions were screened with Drug Interaction Facts software, version 7.0.5.1. Potential interactions were graded by levels of severity (severe, moderate) and Onset of action (rapid and delayed). The data were entered into SPSS software and descriptive statistics were presented.

Results: Of the potential interactions, 72/5% Total drug interactions, 16/7% were classified as major and 55/9% as moderate. 44/1% is potential drug interactions between dexamethasone and Abitanti. Most drugs prescribed chemotherapy, adjuvant chemotherapy drugs and drugs used to treat Comorbidities with warfarin drug interactions.

Conclusion: With increasing scientific knowledge of nurses and doctors from drug interactions, alternative medicines may interact with other medications and by reducing the number of drugs can limit the number of drug interactions and consequences of reduced.

Keywords: Aging, Cancer, Chemotherapy, Drug Interactions

Address: Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Nazloo

Tel: (+98) 0141520501

Email: aramfeizi@yahoo.com

¹ M.Sc Student of Nursing Education, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

² Associate Professor of Nursing, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran (Corresponding Author)