

## تبیین عوامل تسکین‌دهنده تنفس والدینی در بخش مراقبت ویژه نوزادان

هایده حیدری<sup>۱</sup>، مرضیه حسنپور<sup>۲\*</sup>، مرجان فولادی<sup>۳</sup>

تاریخ دریافت ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ تاریخ پذیرش ۱۳۹۴/۰۴/۱۸

### چکیده

**پیش‌زمینه و هدف:** امروزه والدین در مراقبت نوزاد در بخش مراقبت ویژه نوزادان نقش مهمی دارند. از آنجاکه حمایت والدین بخش مهمی از مسئولیت پرستاران می‌باشد. مطالعه‌ای باهدف تبیین عوامل تسکین‌دهنده تنفس والدین اجرا شد.

**مواد و روش کار:** روش تحلیل محتوی کیفی در این مطالعه استفاده شد. مشارکت‌کنندگان مطالعه شامل ۲۱ نفر از والدین، پزشکان و پرستاران بیمارستان‌های شهر اصفهان بودند که به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند.

**یافته‌ها:** بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌ها سه طبقه اصلی عوامل مراقبتی، عوامل مراقبتی درمانی، و عوامل ارتباطی بهدست آمد. **بحث و نتیجه‌گیری:** اکنون عملکرد پرستاران در بخش مراقبت ویژه متمرکز بر بقاء نوزادان و توجه به نیازهای رشد و تکامل آنان است. نظر به این‌که یکی از وظایف پرستار نوزادان ارائه مراقبت مناسب به والدین می‌باشد، شناخت عوامل تسکین‌دهنده تنفس والدین به تیم مراقبتی درمانی در کاهش استرس والدین کمک می‌کند.

**کلیدواژه‌ها:** بخش مراقبت ویژه نوزادان، والدین، تحلیل محتوی کیفی

مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره سیزدهم، شماره هفتم، پی‌درپی ۷۲، مهر ۱۳۹۴، ص ۶۴۷-۶۳۹

آدرس مکاتبه: دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، تلفن: ۰۲۱۶۱۰۵۴۴۱۳

Email: m-hasanpour@sina.tums.ac.ir

### مقدمه

فسار عصبی یا تنفس محركهای محیطی زیان‌آور و ناخوشایندی است که می‌تواند جنبه فیزیولوژیک یا روانی داشته باشد (۱). به دنیا آوردن فرزند نه تنها تجربه جسمی و عاطفی، بلکه تغییر تکاملی در زندگی می‌باشد. تغییر به نقش مادری بحران تکاملی طبیعی است که مشکلات تطبیقی قابل توجهی را برای اکثر زنان به همراه دارد (۲).

واحد مراقبت ویژه‌ی نوزادان غالباً توسط نوزادانی اشغال می‌شود که شدیداً بیمار هستند. این واحد یک محیط فنی با تجهیزات پزشکی نجات‌دهنده می‌باشد. توسعه فناوری و پیشرفت‌های پزشکی عامل افزایش بقای نوزاد در دهه‌های اخیر بوده است. اما این توسعه‌ی فناوری به منزله‌ی یک شمشیر دو لبه است و افزایش ناتوانایی‌های بعدی را به دنبال داشته است (۳).

نکته مهم در طول بستره در بیمارستان آمادگی والدین برای

مراقبت از فرزندانشان می‌باشد. تنفس روانی عاملی است که بر توانایی مادر در تعامل با شیرخوار خیلی کم‌وزن تأثیر دارد. اضطراب مادر سبب اختلال در رفتار والدین می‌شود. در مادرانی که میزان تنفس بالا گزارش می‌شود اشتیاق کمی در رفتار پرورش‌دهنده رشد شناختی چون ارائه تحریکات مناسب با مرحله تکامل نوزاد نارس دیده شده است. مادران و پدران مضطرب با نوزادشان صحبت و تماس کمتری داشته و از نیازهای نوزادشان آگاه نمی‌باشند (۴). آمار نشان داد که ۹ تا ۱۲ درصد از نوزادان در آمریکا و ۵ تا ۷ درصد آن‌ها در اروپا نارس متولد می‌شوند (۵). اکنون در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا برنامه‌های حمایتی برای نوزاد و خانواده اجرا می‌شود. برنامه بررسی و شناخت و مراقبت تکاملی اختصاصی نوزاد، یک رویکرد تکاملی اختصاصی برای مراقبت و حمایت است که این برنامه مراقبتی بر اساس خواندن نشانه‌های رفتاری نوزاد نارس شکل می‌گیرد.

<sup>۱</sup> استادیار، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

<sup>۲</sup> دکترای تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم تهران، تهران، ایران، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

<sup>۳</sup> پروفسور دانشگاه، یاالی فلوریدا آمریکا، آمریکا

پدران علاقهمند انجام شد. معیارهای ورود برای مادران و پدران شامل: تمایل به شرکت در مطالعه، داشتن نوزاد پذیرش شده و حداقل ۲۴ ساعت بستری در NICU، نداشتن سابقه مشکل مشابه در فرزندان، معیارهای خروج برای پدران و مادران شامل: داشتن سابقه مشکل مشابه در فرزندان قبلی، وجود اختلالات روانپزشکی مشخص شده از قبل مثل اختلالات اضطرابی، افسردگی، وسوسی، و سایکوز، به گزارش مشارکت کننده و پرونده آنان بود همچنین معیارهای ورود برای پرستاران و پزشکان شامل: تمایل به شرکت در مطالعه، داشتن حداقل ۶ ماه تجربه کاری در بخش بود.

مشارکت کنندگان اولیه را مادران و پدران بودند. جهت حفظ حداکثر نوع از پزشکان و پرستاران نیز مصاحبه انجام شد. شروع مصاحبه والدین با سؤال باز "خواهش می‌کنم از وقتی که نوزادتون بستری شد برايم صحبت کنيد"، مصاحبه با پرستار و پزشك با سؤال باز "خواهش می‌کنم از مشکلات بخش مراقبت ویژه نوزادان برايم صحبت کنيد. سؤالات موشکافانه در ادامه مصاحبه استفاده شد. جهت کسب داده‌های دقیق‌تر در حین مصاحبه پژوهش‌گر به هدف مصاحبه، ارائه بازخورد، جلب اعتماد، پرهیز از القاء نظرات به مصاحبه‌شونده و عدم تصحیح گفته‌های مصاحبه‌شونده توجه نمود. مدت مصاحبه برای هر مشارکت کننده بین نیم تا یک ساعت طول کشید. نمونه‌گیری و جمع‌آوری داده‌ها و مصاحبه‌ها تا زمانی ادامه داشت که محقق دریافت اشباع داده رخ داده است. منظور از اشباع داده این است که شرکت کنندگان هیچ موضوع یا حقیقت جدیدی را مطرح نکرده و اطلاعات دریافتی تکراری می‌باشند. انجام مصاحبه و تجزیه و تحلیل داده‌ها همزمان انجام شد. در مطالعه حاضر پس از آنکه پژوهش‌گر چندین مرتبه به نوارها گوش کرد، در داده‌ها غرقه شد تا دید کلی نسبت به مصاحبه‌ها پیدا کند. تمام مصاحبه‌ها کلمه به کلمه نسخه‌برداری شد تا کلماتی از متن که در برگیرنده مفاهیم کلیدی است بر جسته شده و به‌این ترتیب کدها استخراج گردید. پس از استخراج مفاهیم و کدها از جملات و پاراگراف‌های مهم آن‌ها بر اساس شباهت‌ها و تفاوت‌ها در طبقات گروه‌بندی شدند و درنهایت طبقات را بر اساس ارتباط بین آن‌ها به ادغام و به تعداد کمتری طبقه‌های اصلی تقلیل یافتند. جهت افزایش روایی داده‌ها نیز این تدبیر اتخاذ گردید: خواندن مکرر مصاحبه‌ها و غرق شدن در داده‌ها، بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادهای تکمیلی همکاران در جهت تأیید و اصلاح صحت کدها و طبقات استخراج شده، برگرداندن تعدادی از مصاحبه‌ها پس از کدگذاری به مشارکت کنندگان بهمنظور بررسی میزان اتفاق نظر در مورد کدها میان محققان و مشارکت کنندگان نیز انجام شد.علاوه پژوهش‌گر پس از اتمام مصاحبه، کدهای مفهومی را بهمنظور موافق نمودن داده‌ها با شرکت کنندگان مرور کرد.

این برنامه سبب ارتقای سلامت نوزاد، کاهش آسیب‌پذیری او، و کاهش تنفس والدین می‌شود. برآیند درازمدت برنامه، ارتقای سلامت نوزاد و خانواده می‌باشد (۶).

مطالعات انجام شده در ایران نشان می‌دهد که بستری نوزاد در بدو تولد در بخش مراقبت ویژه باعث تجربه تنفس نامطلوب در والدین بهخصوص مادران تازه زایمان کرده گردیده است (۷،۸). همان‌گونه که ذکر شد تنفس تعامل والد- شیرخوار را مختل می‌کند و مشکلات عاطفی بسیاری را برای والدین ایجاد می‌نماید. اکنون عملکرد پرستاران در بخش مراقبت ویژه متتمرکز بر بقاء نوزادان و توجه به نیازهای رشد و تکامل آنان است. از آنچه که بستری نوزاد در بخش مراقبت ویژه نوزادان برای والدین تنفس را است و یکی از وظایف تیم مراقبتی درمانی کاهش تنفس والدین می‌باشد و با توجه به تصویب رشتہ کارشناسی ارشد مراقبت ویژه نوزادان در ایران و نظر به این که یکی از وظایف پرستار نوزادان ارائه مراقبت مناسب به والدین می‌باشد، به این منظور مطالعه‌ای باهدف تبیین عوامل تسکین‌دهنده تنفس والدین اجرا شد شناخت این عوامل به تیم مراقبتی درمانی در کاهش استرس والدین کمک می‌کند

## مواد و روش کار

محقق در این مطالعه از رویکرد استقرایی در تحلیل محتوایی داده‌ها استفاده کرد. این فرآیند شامل کدگذاری باز، ایجاد طبقه‌بندی و انتزاع است (۹).

در این مطالعه داده‌های کیفی از طریق ۲۵ مصاحبه فردی عمیق نیمه‌ساختار با ۲۱ مشارکت کننده به روش مبتنی بر هدف جمع‌آوری شدند. مشارکت کنندگان اولیه والدین (پدر و مادر) و مشارکت کنندگان ثانویه متخصصین نوزادان، پرستاران، و سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بودند. مشارکت کنندگان مطالعه شامل ۲۱ نفر از پدران (۶)، مادران (۷)، پرستاران (۵)، پزشکان (۲) و سیاست‌گذار سلامت نوزادان (۱) نفر بودند. از آنجایی در تحقیقات کیفی محقق ابزار مطالعه است. روش جمع‌آوری داده‌های بخش کیفی مطالعه مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته در عرصه بود.

پژوهش‌گر پس از هماهنگی‌های لازم با مسئولین مربوطه به محیط پژوهش وارد شد و از والدین علاقه‌مند به شرکت در مطالعه پس از کسب رضایت‌نامه کتبی آگاهانه از آن‌ها، مصاحبه انجام داد. بهمنظور کسب حداکثر تنوع، مشارکت کنندگان از مناطق مختلف شهر اصفهان، انتخاب شد. مکان انجام مصاحبه‌های فردی، بیمارستان یا محل کار، منزل یا هر جای دیگر به انتخاب و راحتی مشارکت کنندگان بود. نمونه‌گیری به صورت هدفمند از مادران و

می‌گردد. حمایت بستگان و جو همکاری به کاهش تنش کمک می‌کند. این ارتباط با حمایت عاطفی همسر و خانواده تقویت می‌گردد. مادر ۴۱ ساله‌ای در زبانه باره بیان کرد:

"...هیچ جای خالی نداشتن، هم دست به دست هم چه از دور ترا چه درجه یکا همه عین پروانه دور مون همه کار برامون کردن، جو همکاری و محبت خیلی تأثیر داره وقتی می بینی همه با محبت تلاش می کنن تا یه مشکل را حل کنند کار زمین نمونه قلب خوشحال می شه...". [m1]

## ۱-۲- عوامل مراقبتی درمانی:

این طبقه از عوامل تسکین دهنده تنفس خود شامل زیرطبقات  
اهمیت آموزش در کاهش تنفس والدین، ضرورت مراقبت  
خانواده محور، و توانمندسازی والدین می باشد. در ادامه به توضیح  
هر یک می پردازم:

#### ۱-۲-۱- اهمیت آموزش در کاهش تنفس والدین

زیرطیقه "همیت آموزش در کاهش تنش والدین"، شامل مشارکت دادن والدین در امر مراقبت و درمان، آمادگی برای ترجیح، آموزش مراقبت‌ها به والدین، آموزش تعذیب و ضرورت توجه به آموزش والدین بود. به تجربه مشارکت‌کنندگان شناخت NICU و آنچه در آن اتفاق می‌افتد، آموزش مراقب از نوزاد، کنترل شیردهی، و مشارکت دادن والدین در امر مراقبت به تخفیف تنش والدین کمک می‌نماید. مادر ۴۳ ساله‌ای بیان کرد:

"...آموزش تو برنامه کارشون هست که باید به ماما نا هم نحوه شیردوشیدن و گرفتن بچه و مامی عوض کردن را نشون بدن،...". [m1]

پرستار نقش کلی در آموزش والدین دارد به همین دلیل پرستار باید اطلاعات کافی درباره بیماری‌های مختلف نوزاد بستری در بخش مراقبت ویژه را داشته باشد. پرستار ۲۸ ساله‌ای اظهار کرد:

"خیلی نوع آموزش تأثیر داره، اولین چیزی که مهمه پرستار اطلاعات داشته باشه و بتونه منتقل کنه. هم در زمینه علمی هم عاطفی، روابط اجتماعیش بالا باشه. بیشترین کاری که باید به شه رو آموزش و روابط پرستار و بیماره و پرستاران نیاز به آموزش دارن خوب نمی‌دانم و کس‌ها مختلفه...". [n2]

برای نوزادانی که نیازمند مراقبت در منزل توسط مادر می‌باشند آموزش علایم خطر و پیگیری بعد از ترخیص کمک‌کننده است. د. ای: مینه بستار، ۲۶ ساله‌ای، حسن: گفت:

"...آگه یه مثلاً میزگرد با اتند و پرستار والدین نوزاد که بشین  
با هم بحث کنن راجع به بیماری راجع به مریض و کارکردهایی که  
در جهت بھبود مریض یا معرفی جاهایی که به دردشون می خوره  
تشکلا. به شه خوبه والدین: مر فهمند که به فک م برض شومن:

ی افته‌ها

بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها سه طبقه عوامل حمایتی، عوامل مراقبتی درمانی، و عوامل ارتباطی به دست آمد. طبقه عوامل حمایتی شامل زیر طبقات حمایت خانواده، حمایت بستگان، همکاری پرسنل، رسیدگی پرسنل و حمایت پرستاری بود. طبقه عوامل مراقبتی دزمانی شامل زیر طبقات اهمیت آموزش در کاهش تنش والدین، ضرورت مراقبت خانواده محور، و توانمندسازی والدین می باشد. طبقه عوامل ارتباطی شامل دو زیر طبقه پیوند با نوزاد، و ارتباط مناسب پرسنل با والدین بود که در زیر به تفصیل شرح داده خواهد شد:

١-١ عوامل حمايتها:

این طبقه خود شامل زیرطبققات حمایت خانواده، حمایت بستگان، همکاری پرسنل، رسیدگی پرسنل و حمایت پرستار بود. محیط NICU و بستری نوزاد عوامل تنش زایی برای والدین هستند به دلیل آن که مادر حضور دائم در NICU نزد نوزاد دارد بیشتر نیازمند حمایت همسر می شود و حمایت وی سبب آرامش مادر می شود آرامش مادر کمک به شیردهی و کاهش تنش ممکن است. در این باره مادر، ۲۳ ساله‌ای کرد:

"...اونم خوشحال می گه تو دستگاه باشه اشکالی نداره خوب  
می شه دلداریم می داد...". [m7]

علاوه بر حمایت همسر حمایت پرستار و پزشک هم از اهمیت زیادی برخودار است. پرستاران هر روز نوزاد را می‌بینند و می‌توانند آخرین اطلاعات را درباره نوزاد در اختیار والدین قرار دهند.

حمایت پرستار از والدین و اختصاص زمان برای آن‌ها سبب کاهش تنش در آن‌ها می‌شود. پرستار ۲۸ ساله‌ای بیان کرد که: "وقتی خود مادر می‌یاد بالا سر نوزادش و اون آن کارهایی که پرستار به را نوزاد انجام می‌ده را می‌بینه این خودش باعث آرامش مادر می‌شه چون مادرایی که تو خونه‌ان می‌خوان بدون به را نوزادشون چه کارایی می‌شه وقتی خودشون می‌بینن اون مراقبت‌هایی که پرستار به نوزاد می‌ده باعث کاشه تنش می‌شه"<sup>[n2]</sup>

یکی دیگر از مشارکت کنندگان اشاره نمود که:  
"غیر از پرستار، ارتدادها هم می‌توان به کاهش تنفس والدین  
کمک کنن، ارتباط اونا با همراه مریض هم مهمم، ارتباط با پدر و  
مادر خیلی مهمه این که با صبر و حوصله جواب سؤالاشونا بدن  
براشون بیماریا توضیح بدن..."<sup>[n3]</sup>  
بخشی از تکامل نوزاد بستگی به واکنش‌های عاطفی بین او و

"...در حقیقت چیزی که family center اونو پوشش می‌ده این که نوزادان که بیمار هست و در بخش مراقبت ویژه بسته است به علت بیماری نوزاد، پدر و مادر هم بیماران،[d3]." .

بر اساس تجارب مشارکت‌کنندگان و تحلیل کیفی اکنون به مراقبت خانواده محور در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان توجهی نمی‌شود. بنابراین لازم است که برای تغییر نگرش پرسنل مراقبتی اقدامات لازم صورت گیرد. برای مثال یکی از پزشکان نوزادان بیان کرد:

"آن چه مهم است تغییر نگرش پزشکان ما هست نه فضای فیزیکی، ممکن است فضا فیزیکی هم فراهم کنیم همانطور که بسیاری جاها فضای بالایی دارن اما رنگ و بو و نشانی از والدین وجود نداره جا انداختن ضرورت care family center اهمیت داره ما باید جزء برنامه آموزشی‌شون به شه...[d3]."

#### ۱-۲-۳ - توانمندسازی والدین

این زیرطبقه از زیرطبقات دیگری مثل اهمیت توانمندسازی والدین، لزوم حاکمیت بالینی والدین، و ضرورت تقویت سلامت جامعه به روش تحلیل محتوای کیفی شکل گرفت. یکی از عواملی که سبب کاهش تنش والدین می‌شود مشارکت در امر مراقبت از نوزاد است که سبب افزایش اعتماد به نفس والدین و احساس توانمندی در آنان می‌شود.

پزشک متخصص نوزادان با داشتن سابقه کاری در بخش مراقبت ویژه نوزادان در این باره اظهار کرد:

"...آن‌ها احساس می‌کنند توانند به شن بحث همون COPE یعنی توانمندسازی خانواده‌ها، کاری بکنیم که والدین توانند به شن در مراقبت کردن از بچه‌شون که وقتی در بخش مراقبت‌ها را در منزل هم درست انجام بدن"[d3].

اکنون در بخش‌ها هدف مراقبت از نوزاد است و والدین جزیی از درمان و مراقبت در نظر گرفته نمی‌شوند در صورتی که توجه به والدین در بخش علاوه بر انجام اقدامات مراقبتی از نوزاد سبب آرامش آنان می‌شود.

یکی از مشارکت‌کنندگان متذکر شد:

"...بحث family center است حالا بحث حاکمیت بالینی والدین هست. که والدین در NICU ولی بیمار هستن. ممکن بخش خیلی خوب باشه ولی این مفهوم جا نیافتاده اصل بر اینکه این مفهوم جا بیافته [d3]."

اگر در جامعه زن و مرد توانمند و از سلامت روانی برخوردار باشند پس از ازدواج هم پدران و مادرانی توانمند خواهند بود. پزشک متخصص نوزادان چنین گفت:

آرامش پیدا می‌کنن که تیم پزشکی و پرستاری به فکر نوزاد و خودشون هستن...".[n3].

والدین باید در مورد مشکلات موجود توجیه شوند و توضیح باید با توجه به فرهنگ و سطح فهم آنان باشد. یکی از مشارکت‌کنندگان پرستاردر این زمینه بیان نمود:

"..نمی‌تونن درک کنن مریضی که نارسه از نظر ظاهر می‌گن این دستاش که سالم بود پاهاش که سالم بود مشکلی نداشت نمی‌دونه درون نوزاد چه خبره باید اینا برash توجیه کرد که نوزاد ریه‌های نارسی داره باید داره به گیره، بازم بستگی به فرهنگ و سطح تحصیلات خونواده داره ...".[n5]

یافته‌ها نشان داد پرستار باید مطمئن باشد که مادر استقلال و اعتماد به نفس جهت شیردهی مناسب و مراقبت از نوزاد را به دست آورده است. رفتار و انجام وظایف صادقانه پرستاری در کاهش تنش والدین کمک کننده است هنگامی که والدین کار پرستار و رسیدگی آن‌ها را می‌بینند، احساس آرامش می‌کنند. در این رابطه پدر ۳۰ ساله‌ای بیان کرد که:

"...آگه پرستار و پرسنل نبودن خانم نالمید می‌شد. خدایش خوب بعضی وقتی هم دانشجوها می‌یان ناخواسته میرن بالا سر بچه و اذیت می‌کنن به هر حال کم و زیاد هستند اصلش دکترا و پرستاری شبانه روزن که خدایش خیلی زحمت می‌کشن...".[f5]

مشارکت والدین در مراقبت و ملاقات آن‌ها از نوزاد سبب کاهش تنش می‌شود. همکاری پرستار با والدین در امر مراقبت سبب امیدواری آن‌ها شده و احساس آرامش در آن‌ها ایجاد می‌ماید. چنانچه مادر ۲۳ ساله‌ای اظهار کرد:

"...زیاد رسیدگی می‌کنن دکتر، پرستار، ساعتی یا ۲ ساعت یک بار زنگ می‌زنن شیر نداره، نوار می‌خواهد هر چی لازم داشته باشه یه ساعتی یا دو ساعتی زنگ می‌زنن که بیان یا بچه را ببینید آلان صبح زنگ زدن گفتن شیر می‌خواهد عصر دوباره زنگ زدن گفتن شیر می‌خواهد گفتم ندارم. گفتم بیا برash شیر خشک بگیرم. شیر خشک آوردم گفتن ساعت ۷ بیا تا روش شیر دادنا یاد بگیری. آلان او مدم تا بم یاد بدن چه جوری بچه را ازش نگهداری کنم گفتن امشب این جا باشی...".[m7]

#### ۱-۲-۲ - ضرورت مراقبت خانواده محور:

این زیرطبقه شامل اهمیت مراقبت خانواده محور، و ضرورت تغییر نگرش پرسنل مراقبتی درمانی است. با توجه به تحلیل محتوای کیفی داده‌های حاصل از مصاحبه‌های کیفی مراقبت خانواده محور یعنی تقویت مشارکت خانواده در فرآیند مراقبت، ارائه اطلاعات وسیع درباره روش‌های مراقبتی، دخالت دادن خانواده در فرآیند تصمیم‌گیری و حمایت روانی از آنان است. یکی از مشارکت‌کنندگان چنین گفت:

تجارب مشارکت کنندگان نشان داد که صحبت با نوزاد و در کنار وی ماندن هم به والدین آرامش می‌دهد. تماس بدنی زمان بهبودی نوزاد را کوتاه می‌نماید و منجر به ترخیص زودتر وی می‌شود. آرامش والدین در گرو پیشرفت وضعیت نوزاد می‌باشد بهبودی در وضعیت نوزاد سبب آرامش والدین می‌شود. جدا شدن نوزاد از دستگاه ونتیلاتور و برطرف شدن مشکل تنفسی وی نشانه‌هایی از بهبودی در وضعیت نوزاد است که سبب آرامش والدین می‌شود مادر ۲۶ ساله‌ای بیان کرد که:

"ساعت ۹ اوتمدم گفت می‌توనی شیر برآش به یاری، دیگه ساعت ۹ شیر بش دادم همین که فهمیدم شیر می‌خوره و دستگاهها جدا شدند یک کمی بهتر شدم..."[m3]

پدر ۲۸ ساله‌ای نیز در این خصوص گفت:

"هر وقت می‌اوتمدم می‌دیدم تنفسش بهتر شده آروم می‌شدم یا دستگاهها را ازش جدا کردن بهتر می‌شدم..."[f2]. والدین با دیدن نوزاد و سرحال بودن وی احساس خوشحال و آرامش می‌نمایند. تقدیه نوزاد و افزایش وزن نوزاد هم باعث آرامش آنان می‌شود. پدر ۳۰ ساله‌ای اظهار کرد:

"دیدم که روز به روز داره پیشرفت می‌کنه بچه‌مون خوب می‌شه داره وزن می‌گیره داره دوا درمان می‌شه خوب و قتنی می‌یام می‌بینم سر حال داره می‌خنده چشم‌اش بازه اینا خوشحال خوشحالی و ناراحتی‌مون همه‌ش بچه است..."[f5].

۱-۳-۲- ارتباط مناسب پرسنل با والدین:

این زیرطبقه خود دارای زیرطبقات؛ توجه و اهمیت به والدین در بخش، و دادن اطلاعات کافی در مورد وضعیت نوزاد بود. تحلیل داده‌های این طبقات نشان داد که صحبت‌های پزشک و پرستار درباره بیماری و مراقبت از نوزاد سبب امیدوار شدن والدین می‌شود. برای مثال مادر ۲۶ ساله‌ای چنین گفت:

"این که دکترا به من امید می‌دادن می‌گفتن زردیش خوب شده، داره شیرش می‌خوره، امروز فردا مرخص می‌شه، به من امید می‌دن، خوبن به من می‌رسن، من با حرف‌اشون راست باشه یانه دیگه نمی‌دونم نمی‌دونم به حرف‌اشون امیدوارم..."[m5].

پرستار ۲۸ ساله‌ای نیز چنین بیان کرد:

"پرستاری که زمان می‌ذاره همراه، نصفی از تنش‌هاش کم شده تا این که اصلاً برآش توضیح ندیم و با همراه بیمار اصلاً صحبت نکنیم. حالا چه طوره نسبت به دیروز روندش، چه طور بوده، این خیلی مهمنه که ادامه‌ش چه طوری می‌شده، آینده‌ش با این روند چه طوری به شه، خیلی از تنش‌اشونا کم می‌کنه خیلی مهمه..."[n2].

نتایج نشان داد والدین نیاز دارند در صورت داشتن سؤال، با متخصص نوزادان و با پرستار صحبت کنند، والدین باید از

"آگه ما دیدیم والدینی دچار مشکلات روحی روانی شدند بستری هم برای درمان اونها وجود نداره آموزش‌هایی که از قبل به مادر داده اون را آماده نکرده برای در حقیقت هضم مشکلات و بر می‌گردد به health و سطح میزان فرنگ و life style تمام آحاد زندگی مملکت ما بر می‌گردد، اصولاً دیگه پدر و مادر یه فردی عادیه باید بتونه در شرایط عادی بر روح و روان خودش کنترل داشته باشه..."[d3].

### ۱-۳- ۱- عوامل ارتباطی:

این طبقه شامل دو زیر طبقه پیوند با نوزاد، و ارتباط مناسب پرسنل با والدین بود که در زیر به توضیح هر یک می‌پردازم:

#### ۱-۳-۱- پیوند با نوزاد:

این زیرطبقه خود از زیرطبقات فرعی‌تری مثل ملاقات نوزاد، و لمس نوزاد بهبودی در وضعیت نوزاد تشکل شد. نتایج نشان داد افزایش ارتباط با نوزاد سبب آرامش والدین می‌شود والدین باید زمانی را با نوزاد بگذرانند. تماس بدنی با نوزاد لازمه ملاقات مکرر از وی می‌باشد. بدلیل اهمیت ملاقات والدین با نوزاد، محدودیت پدر برای ملاقات مشکل است چرا که حضور ساعت مشخص برای ملاقات مشکل است. پدر ۳۰ ساله‌ای بیان کرد:

"ما توقع‌مون زیاده که بیشتر برمی‌پیش بچه‌مون چون از بیرون شهر می‌یام و ۱۸ ساعت پشت دریم دوست داریم دو بار سه بار بینیمیش و روچیه‌مون بازتر شه لاقل وقتی اینجا یم بیشتر بینیم..."[f5].

مادر ۴۳ ساله‌ای اظهار کرد که:

"شانسیشون گفت پدربرزگ و مادر بزرگ پرستار خوب بود ۱۰ ثانیه بچه را دیدند پسر اول هست و همین قدر بابا بزرگ ۱۰ ثانیه ایستاد دیدش اما همین که دید آرام شد..."[m1].

بهترین راه برای کمک به نوزاد در NICU، حضور والدین جهت شناخت علت رفتارهای نوزاد می‌باشد در نتیجه پدر و مادر متوجه خواهند شد فرزندشان چه وقت ناراحت است و نیاز به استراحت دارد و چه وقت آماده برقراری ارتباط با آنان است. تماس با نوزاد در NICU از اهمیت به سزاگی برخوردار است. تماس والدین با نوزاد سبب آرامش در آن‌ها می‌شود همچنان که مادر ۲۶ ساله‌ای گفت:

"ولی من می‌بینم واقعاً بچه‌م خوبه زردیش خوب شده انگار چون گرفته، بچه می‌خنده، دستمای می‌گیره" [m5].

مشارکت‌کننده‌ی دیگری بیان کرد که:

"وقتی بچه ما می‌بینم، آرامش با موسیقی، گریه می‌کنم آروم می‌شم شوهرم نوازش کنه اونم هست. این که بچه ما ببینم باشی حرف بزنم آرامش پیدا می‌کنم..."[m7].

تعامل با نوزاد در حمایت مادران برای مشارکت در مراقبت فرامینایند (۱۳). یافته‌های مطالعه به لک<sup>۳</sup> و همکاران در سال ۲۰۰۹ در امریکا نیز نشان داد که افزایش تنش مادر ناشی از محیط NICU و بیماری شیرخوار است به منظور کاهش تنش نیاز به مشارکت مادر در امر مراقبت است (۱۴).

کاروالهو<sup>۴</sup> و همکاران در سال ۲۰۰۹، در برزیل نیز بیان کردند که، مداخلات روانی برای والدین نوزادان بسترهای در بخش مراقبت‌های ویژه سبب کاهش میزان اضطراب و افسردگی می‌شود. بر اساس یافته‌های آنان مادران نوزادان نارس نیاز به حمایت روانی دارند. (۱۵).

بر اساس نتایج مطالعه حاضر علاوه بر حمایت روانی، دادن اطاعات به والدین سبب کاهش تنش آنان می‌شود. آلدرسون<sup>۵</sup> و همکاران در سال ۲۰۰۵ در انگلیس بیان کردند به والدین باید اطلاعات واضح و ضمنی درباره قوانین بخش که چه انجام دهند یا چه انجام ندهند را یاد بگیرند. آن‌ها بعید است که از چگونگی قوانین مختلف در بخش‌های مراقبت ویژه آگاه باشند، حضور در راندهای پزشکی و افزایش زمان ملاقات نوزاد از جمله اقداماتی است که سبب کاهش تنش والدین شد. آن‌ها پیشنهاد کردند که قوانین بازتر و قابل دسترس موجب اطمینان بیشتر والدین می‌شود (۱۶).

یافته‌های مانتیما<sup>۶</sup> و همکاران در سال ۲۰۰۵، در فنلاند نشان داد که کاهش تنش والدین از جمله مهم‌ترین اقدامات و استراتژی‌هایی است که سبب کاهش ادراکات منفی مادر از نوزاد می‌گردد. همچنین آن‌ها اظهار کردند که سلامت روان مادر در درک وی از نوزاد اهمیت ویژه‌ای دارد (۱۷).

نتایج مطالعه ما نشان داد که مراقبت خانواده محور سبب کاهش تنش والدین می‌شود. مطالعات دیگر این یافته را تأیید کردند. نتایج مطالعه هاریسون<sup>۷</sup> در کانادا نشان داد که مراقبت خانواده محور فلسفه مراقبت پرستاری اطفال در نظر گرفته شده است (۱۸). بر اساس یافته‌های ویلینگا، اسمیت، و اونک<sup>۸</sup> در سال ۲۰۰۶ در هلند، اجرای مراقبت‌های تکاملی سبب افزایش رضایت والدین و احساس استقلال حرفاًی پرستاران می‌شود. تغییر فرهنگ به مراقبت تکاملی اختصاصی خانواده محور در بخش مراقبت‌های ویژه فرآیندی آهسته و تدریجی است. بررسی پیشرفت کیفیت این فرآیند باید به صورت مداوم انجام گیرد (۱۹). یافته‌های جوتز و پوتز<sup>۹</sup> در سال ۲۰۰۵ در آلمان، نشان داد

دستگاه‌های متصل به نوزاد آگاه شوند و آموزش‌های لازم را دریافت نمایند، مطلع شدن از وضعیت نوزاد، دانستن علت بیماری به آن‌ها آرامش می‌دهد.

پدر ۴۸ ساله‌ای در این‌باره چنین اظهار کرد که: "... دلگرمی‌های دکتر بود خوب می‌گفت به خدا توکل کنید ما زحمتنا می‌کشی خیلی زحمت کشیدن و همدمش دلگرمی می‌دادن امید می‌دادن می‌گفتن ما زحمت می‌کشیم شما به خدا توکل کنین خوب آدم دلگرم‌تر می‌شه م...". [f3].

## بحث و نتیجه گیری

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که حمایت خانوادگی و پرستاری در کاهش تنش کمک‌کننده است. در این رابطه ایونگ و کارت<sup>۱</sup> در سال ۲۰۰۴ در امریکا اظهار کردند که برای مراقبت از نوزاد بدهال باید ارزش‌ها، اعتقادات و عملکردهای پرسنل‌های مختلف در گیر در مراقبت با خانواده را مد نظر قرار داد، که به دنبال آن اعتقادات، ارزش‌ها، و رؤیاهای خانواده درباره نوزادشان توسعه یابد (۱۰). اسلوان و همکاران در سال ۲۰۰۸، نیز در امریکا بیان کردند که خانواده و رفقاً مهم‌ترین منابع حمایت روحی می‌باشند. خانواده و دوستان منبع حمایت اجتماعی و خانواده‌ها منبع حمایت عملکردی می‌باشند. همچنین پدران، پرسنل مراقبتی را به عنوان منبع اصلی حمایت اطلاعاتی معرفی کردند. پدران در مرحله حاد بیماری تنش بیشتری نسبت به موقعیت ثبتیت شده و بهبودی نوزاد گزارش نمودند (۱۱).

نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که زحمت شب‌انه‌روزی پرسنل برای رسیدگی به آن‌ها از عوامل کاهش تنش والدین است. یافته‌های مطالعه توریل<sup>۲</sup> در سال ۲۰۰۰ در انگلیس نیز در تأیید یافته فوق نشان داد که پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه نوزادان به دلیل محیط ویژه این بخش، تغییرات وضعیت نوزاد و تصمیم‌گیری اخلاقی، و درجات بالای مهارت‌های تکنیکی موردنیاز، فشار زیادی را متحمل می‌شوند، که پیامد چنین شرایطی خستگی و فرسودگی است (۱۲).

بر اساس یافته‌های حاصل از مطالعه حاضر دیدن نوزاد و صحبت مادر با او به کاهش تنش والدینی کمک می‌کند، حضور والدین در بخش برای تماس با نوزاد ضروری است. شین و تروت در سال ۲۰۰۷ در امریکا بیان کردند که پرستاران باید هنگام پذیرش نوزاد به NICU حداکثر مشارکت مادران را تشویق نمایند. مراقبت کانگورویی راه‌کار مناسبی برای ارتقاء مشارکت مادری است. همچنین پرستاران باید فرصت‌های مناسبی را برای تماس و

<sup>3</sup> Black

<sup>4</sup> Carvalho

<sup>5</sup> Alderson

<sup>6</sup> Mäntymäa

<sup>7</sup> Harrison

<sup>8</sup> Wielenga, Smit, & Unk

<sup>9</sup> Jotz & Poets

<sup>1</sup> Ewing & Carter

<sup>2</sup> Turrill

نوزاد در بیمارستان داشتند (۲۴).

### نتیجه‌گیری

پرستاران منبع مهم اطلاعات و حمایت برای والدین هستند. حمایت‌های روحی و روانی یکی از وظایف تیم مراقبتی درمانی است. به علاوه آگاهی تیم مراقبتی از عوامل تسکین‌دهنده تنفس والدین را بخش مراقبت ویژه به آنان کمک خواهد کرد تا با شناخت این عوامل مداخلات پرستاری مناسب جهت کاهش تنفس والدین را اجرا نمایند. این مطالعه کیفی است که در شهر اصفهان کشور ایران و با شرایط مراقبتی موجود انجام گرفته است و قابلیت تعمیم به همه جوامع را ندارد. بنابراین چون تحقیق کیفی قابلیت تعمیم به همه جوامع ندارد پیشنهاد می‌گردد که مطالعات کمی در زمینه تأثیر عوامل حمایتی، مراقبتی و ارتباطی بر کاهش تنفس والدین در بخش مراقبت ویژه نوزادان انجام گردد.

### تشکر و قدردانی

محققین از کلیه مشارکت‌کنندگان بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خاطر همکاری در این پژوهش کمال تشکر را دارند. همچنین از مسئولین محترم معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای حمایت‌های مالی طرح پژوهشی مصوب حاضر اصفهان با شماره ۳۸۹۲۹۴ صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایند. همچنین از سرکار خانم سعیده حیدری کارشناس ارشد ادبیات به خاطر ویراستاری ادبی مقاله نهایت سپاس و امتنان را داریم.

### References:

8. Noury R, Kelishadi R, Ziaoddini H. Study of Common Stresses among Students in Tehran. *J Isfahan Med School* 2010;28(105).
9. Lee S-Y, Kimble LP. Impaired sleep and well-being in mothers with low-birth-weight infants. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs* 2009;38(6):676–85.
10. Walther FJ. Withholding treatment, withdrawing treatment, and palliative care in the neonatal intensive care unit. *Early hum Develop* 2005;81(12):965-72.
11. Higman W, Shaw K. Nurses' understanding about the delivery of family centred care in the neonatal
- unit. *J Neonatal Nurs* 2008;14(6):193-8.
12. Khalajinia Z, Jandaghi G. Maternal risk factors associated with preterm delivery in Qom province of Iran in 2008. *Sci Res Essays* 2012;7(1):51-4.
13. Als H. Newborn individualized developmental care and assessment program (NIDCAP): new frontier for neonatal and perinatal medicine. *J Neonatal-perinatal Med* 2009;2(3):135-47
14. Malakouti J, Jebraeili M, Valizadeh S, Babapour J. Mothers' experience of having a preterm infant in the Neonatal Intensive Care Unit, a Phenomenological Study. *J Crit Care Nurs* 2013;5(4):172-81.

<sup>1</sup> Escobar, Clark& Greene

<sup>2</sup> Nyström

<sup>3</sup> Axelin

<sup>4</sup> Melnyk

8. Valizadeh L, akbarbegloo M, Asadollahy M: The effective stressors on mothers of preterm babies in the neonatal intensive care unit. *Tabriz univ Med Sci* 2009;31(1):85-90.
9. Elo S, Kyngäs H. The qualitative content analysis process. *J Adv Nurs* 2008; 62(1): 107-15.
10. Ewing A, Carter BS. Once again Vanderbilt NICU In Nashville leads the way in nurses' emotional support. *Pediatr Nurs* 2004;30(6):471-2
11. Sloan K, Rowe J, Jones L. Stress and coping in fathers following the birth of a preterm infant. *J Neonatal Nurs* 2008;14(4):108-15.
12. Turrill S. A situational analysis: the potential to produce evidence-based nursing practice guidelines within a regional neonatal intensive care unit. *J Nurs Manag* 2000;8(6):345-55.
13. Shin H, White-Traut R. The conceptual structure of transition to motherhood in the neonatal intensive care unit. *J Adv Nurs* 2007;58(1):890-898.
14. Black BP, Holditch-Davis D, Miles MS. Life course theory as a framework to examine becoming a mother of a medically fragile preterm infant. *Res Nurs Health* 2009;32(1):38-49.
15. Carvalho AEV, Linhares MBM, Padovani FHP, Martinez FE. Anxiety and depression in mothers of preterm infants and psychological intervention during hospitalization in neonatal ICU. *Spanish J Psychol* 2009;12(01):161-70.
16. Alderson P, Hawthorne J, Killen M. Parents' experiences of sharing neonatal information and decisions: Consent, cost and risk. *Soc Sci Med* 2006;62(6):1319-29.
17. Mäntymaa M, Puura K, Luoma I, Salmelin RK, Tamminen T. Mother's early perception of her infant's difficult temperament, parenting stress and early mother-infant interaction. *Nordic J Psychiatry* 2006;60(5):379-86.
18. Harrison TM. Family-centered pediatric nursing care: State of the science. *J Pediatric Nurs* 2010;25(5):335-43.
19. Wielenga JM, Smit BJ, Unk LK. How satisfied are parents supported by nurses with the NIDCAP® model of care for their preterm infant? *J Nurs Care Quality* 2006;21(1):41-8.
20. Jotzo M, Poets CF. Helping parents cope with the trauma of premature birth: an evaluation of a trauma-preventive psychological intervention. *Pediatrics* 2005;115(4):915-9.
21. Escobar GJ, Clark RH, Greene JD. Short-term outcomes of infants born at 35 and 36 weeks gestation: we need to ask more questions. *Seminars in perinatology*; Elsevier; 2006.
22. Nyström K, Axelsson K. Mothers' experience of being separated from their newborns. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs* 2002;31(3):275-82.
23. Axelin A, Lehtonen L, Pelander T, Salanterä S. Mothers' different styles of involvement in preterm infant pain care. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs* 2010;39(4):415-24.
24. Melnyk BM, Feinstein NF, Alpert-Gillis L, Fairbanks E, Crean HF, Sinkin RA, et al. Reducing premature infants' length of stay and improving parents' mental health outcomes with the Creating Opportunities for Parent Empowerment (COPE) neonatal intensive care unit program: a randomized, controlled trial. *Pediatrics* 2006;118(5):e1414-e27.

## EXPLORING PARENTAL STRESS RELIEF FACTORS IN NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT(S)

*Heidari H<sup>1</sup>, Hasanpour M<sup>2\*</sup>, Fooladi M<sup>3</sup>*

*Received: 5 Apr, 2015; Accepted: 9 Jul, 2015*

### Abstract

**Background & Aims:** Parents play an important role in the care of infants in NICUs. Since parental support is an important part of the nurse's responsibility, this study was conducted to investigate the factors of parental stress relief.

**Material & Methods:** Qualitative content analysis was used in this study. Study participants included 21 parents, doctors and nurses in Isfahan hospitals who were selected by purposive sampling method.

**Results:** Based on the data analysis, three main categories were observed including supportive care factors, health care factors, and communication factors.

**Conclusion:** Nurses performance in the NICU focuses on the survival and development needs of the infants. By taking into consideration that one of the tasks of neonatal nurses is providing proper care to the parents, awareness of the health care providers of parental stress relief can help them to reduce the stress of parents.

**Keywords:** NICU, parents, qualitative content analysis

**Address:** Marzieh Hasanpour, PhD in Nursing, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

**Tel :** (+98)31 37922909-37922921

**Email:** m-hasanpour@sina.tums.ac.ir

<sup>1</sup> Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.

<sup>2</sup> PhD in Nursing, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran and Nursing and Midwifery Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.. (Corresponding Author)

<sup>3</sup> Fulbright Scholar and Professor at Florida State University, College of Nursing