

مowanع آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران در ایران: مرور سیستماتیک

محسن ادیب حاج باقری^{*}، محمد زارع^۱

تاریخ دریافت ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ تاریخ پذیرش ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

چکیده

پیش‌زمینه و هدف: آموزش به بیمار یکی از ابعاد مهم مراقبت‌های پرستاری و از نقش‌های کلیدی پرستار به شمار می‌رود. به همین دلیل، شناخت موانع آن می‌تواند تأثیر زیادی بر فرآیند توانمندسازی و ارتقاء کیفیت آموزش به بیمار داشته باشد. این مرور باهدف بررسی موانع آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران در ایران انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مروری، مقالات تحقیقی در زمینه موانع آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران به دو زبان فارسی و انگلیسی، بدون محدودیت زمانی در پانکهای اطلاعاتی: PubMed، Web of Sciences، Scopus، Science Direct، ERIC، ProQuest، MagIran، Google Scholar، IranMedex و IranDoc جستجو شد. انجام پژوهش در ایران معیار اصلی ورود به مطالعه بود. پس از ارزیابی معیارهای ورود و کیفیت مقالات، ۲۴ مقاله از نظر محتوا دسته‌بندی و تحلیل گردید.

یافته‌ها: طیف گسترده‌ای از موانع آموزش به بیمار در مطالعات ارائه شده است. پس از دسته‌بندی موضوعی، پنج حیطه اصلی شناسایی شد: ۱) موانع مرتبط با پرستاران؛ کمبود وقت به دلیل تراکم کاری پرستاران ۲) موانع مرتبط با بیماران؛ وضعیت نامساعد جسمی و روحی بیمار ۳) موانع مدیریتی؛ عدم حمایت از سوی مدیران جهت رفع نیازهای آموزشی ۴) موانع سازمانی؛ عدم تناسب تعداد بیماران و پرستاران و ۵) موانع محیطی؛ عدم همکاری اعضای تیم درمانی در اجرای برنامه‌های آموزشی.

بحث و نتیجه‌گیری: اکثر موانع اجرای آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران، مربوط به عوامل مرتبط با پرسنل پرستاری است. جهت بهبود وضعیت آموزش، ضروری است مدیران با اتخاذ تدبیری همچون تأمین نیروی پرستاری، اختصاص بودجه کافی و نظارت مناسب، پرستاران را در این امر مهم ترغیب نمایند.

کلیدواژه‌ها: آموزش بیمار، موانع، دیدگاه پرستاران، پرستاری، مرور سیستماتیک، ایران

مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره پانزدهم، شماره هفتم، پی‌درپی ۹۶، مهر ۱۳۹۶، ص ۵۵۸-۵۴۴

آدرس مکاتبه: کاشان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، تلفن: ۰۳۱-۵۵۵۴۶۶۳۳

Email: adib1344@yahoo.com

مقدمه

سلامتی، افزایش رضایت مددجو، بهبود کیفیت زندگی، اطمینان از تداوم مراقبت، کاهش اضطراب بیمار، کاهش بروز عوارض بیماری، خروج زودتر از تخت، اقامت کوتاه‌تر در بیمارستان، افزایش استقلال مددجو در انجام فعالیت‌های روزمره و گذراندن دوره نقاوت در منزل، ضرورت آموزش به بیمار، بهطور چشمگیری هزینه‌های مراقبتی و برنامه‌های آموزش به بیمار، در انجام فعالیت‌های روزمره و گذراندن دوره نقاوت در منزل، افزایش رضایت مددجو، بهبود کیفیت زندگی، اطمینان از تداوم مراقبت، کاهش اضطراب بیمار، کاهش بروز عوارض بیماری، خروج زودتر از تخت، اقامت کوتاه‌تر در بیمارستان، افزایش استقلال مددجو در انجام فعالیت‌های روزمره و گذراندن دوره نقاوت در منزل، ضرورت آموزش به بیمار، بهطور چشمگیری هزینه‌های مراقبتی و درمانی را کاهش می‌دهد؛ بهطوری که به ازای هر یک دلاری که صرف آموزش به بیمار می‌شود، ۳ تا ۴ دلار در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود.

آموزش به بیمار، یکی از جنبه‌های اساسی در مراقبت از بیمار (۱) و فرآیندی بیمار محور است که بر نیازهای بیمار و تیم بهداشتی درمانی جهت کمک به وی در تصمیم‌گیری مشارکتی و آگاهانه، استوار است (۲). فلسفه آموزش به بیمار، به کارگیری اطلاعات و مهارت‌های آموخته شده توسط بیمار برای کنترل و کنار آمدن هرچه بهتر با بیماری (۳، ۴) و همچنین کمک به فرد جهت بهبود زندگی و رسیدن به حداکثر سلامت و قابلیت‌های جسمی و روانی است (۵). آموزش به بیمار اثرات مفید بسیاری دارد که در پژوهش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج متعددی از جمله ارتقای

^۱ استاد مرکز تحقیقات پرستاری ترما، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران (نویسنده مسئول)

^۲ دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالماندی، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، کاشان، ایران

مطالعات موجود در زمینه موضع آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران ایران انجام دهنده.

مواد و روش کار

این مطالعه از نوع مروری سیستماتیک (Systematic Review) است. جامعه پژوهش شامل کلیه مقالات علمی در زمینه آموزش به مددجویان در ایران است که در یکی از پایگاه‌های اینترنتی مقالات، نمایه شده باشد.

جستجو توسط محققان در پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی: Science, ISI Web of Science, ERIC, Scopus, PubMed, Google Scholar, ProQuest, Direct, FarsciZبان: بانک اطلاعات نشریات کشور (MagIran), پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IranDoc) و سامانه دانش‌گستر برکت (IranMedex) انجام شد. جهت حفظ تمامی داده‌های بالرزش، محدودیتی از نظر بعد زمانی در نظر گرفته نشد و کلیه مقالات تا زمان جستجو توسط محقق، مورد بررسی قرار گرفتند.

برای یافتن مقالات مرتبط در پایگاه‌های انگلیسی‌زبان، از کلیدواژه‌های (Train*, Instruct*, Teach*, Educat*) یا (Obstruct*, Barrier, Obstacle, Learn*) به صورت ترکیبی و با استفاده از میانجی‌های AND و OR استفاده شد. استراتژی جستجو در پایگاه‌های PubMed و ISI Web of Science بر اساس ترکیب زیر بود:

(train* OR teach* OR educat* OR instruct* OR learn*) AND (obstacle OR barrier OR obstruct*) AND (patient OR client)

کلیدواژه‌های مورد استفاده برای جستجو در پایگاه‌های فارسی شامل ترکیب واژه‌های "آموزش"، "یادگیری"، "مدجو" و "بیمار" به صورت چندتایی بود. به علت اینکه مقالات منتشرشده در پایگاه‌های نامبرده نسبت به پایان‌نامه‌هایی که مقاله نشده‌اند معتبرتر و دسترسی به منابع اینترنتی نسبت به کتاب‌ها و پایان‌نامه‌ها مقدورتر است، از منابع کاغذی استفاده نشد.

پس از انجام جستجو، ۳۸۲۸ مطالعه، به دست آمد. برای سازمان‌دهی مطالعات، از نرم‌افزار مدیریت منابع اطلاعاتی Endnote (Thomson Reuters, X7.5, Bld 9325 از نرم‌افزار مذکور و با مرور بر عنوان و چکیده مقالات، ۱۲۷۶ مطالعه تکراری حذف شد. سپس چکیده ۲۵۵۲ مقاله توسط محققان

نتایج مطالعات قربانی و همکاران (۲۰۱۴) و آفاخانی و همکاران (۲۰۱۲) پیرامون موضوع آموزش به بیمار در ایران، نشان می‌دهد که اگرچه مداخلات آموزشی برای بیماران بسیار بازرس است، اما آموزش نامناسب از رایج‌ترین شکایات بیماران در بخش‌های مختلف مراقبتی می‌باشد (۹، ۱۰).

پرستاران به عنوان یکی از اجزای کلیدی در سیستم‌های بهداشتی درمانی، نقش ارزنده‌ای در آموزش به بیماران دارد؛ زیرا دسترسی بیشتری به بیمار و خانواده وی داشته و زمان زیادی را صرف مراقبت می‌کنند. در نتیجه فرصت‌های مکرری برای آموزش فراهم‌شده و می‌توانند کیفیت آموزش‌ها را ارزشیابی نمایند (۱۱). با وجود اینکه اکثر پرستاران، معتقدند یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های آنان در مراقبت از بیمار، آموزش است؛ اما مطالعه استرومبرگ^۱ و همکاران (۲۰۰۵) نشان داده است که در مقایسه با سایر وظایف پرستاری نظیر دارودارمانی، مراقبت‌های پرستاری و مستندسازی اطلاعات، از اولویت کمتری برخوردار است (۱۳). از آنجاکه پرستاران می‌توانند در تغییر رفتار و عملکرد بیمار تأثیرگذار باشند، بنابراین، آگاهی از نظرت آنان می‌تواند در شناسایی موضع آموزش و کمک به برنامه‌ریزی و ارتقاء برنامه آموزش به بیمار مؤثر باشد (۱۴).

اگرچه مطالعاتی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای نامناسب آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران در کشورهای مختلف صورت گرفته است، نتایج این پژوهش‌ها، موضع متفاوتی را به عنوان عوامل مؤثر گزارش کرده‌اند. مطالعات انجام‌شده در خارج از کشور نشان می‌دهد که عدم حمایت مدیران از پرستاران، کمبود زمان، و نیز هزینه‌های شرکت در دوره‌های آموزش مدام، از موضع اصلی آموزش به بیمار به شمار می‌روند (۱۵-۱۷). در ایران نیز پژوهش‌هایی در این زمینه انجام شده است. در این میان می‌توان به مطالعات موسوی و همکاران (۱۳۹۱) و برهانی و همکاران (۱۳۸۰) اشاره کرد. موسوی و همکاران، عدم تناسب تعداد بیمار و پرستار را مهم‌ترین مانع آموزش به بیمار معرفی کرده‌اند (۱۸)، در حالی که برهانی عدم وجود محل مناسب برای آموزش و کوتاه بودن مدت بستری بیماران را به عنوان موضع اصلی آموزش به بیمار معرفی کرده است (۱۹). لذا این سؤال مطرح می‌شود که از دیدگاه پرستاران چه موضعی بر اجرای برنامه‌های آموزش به بیمار تأثیر می‌گذارند؟

پژوهش‌های صورت گرفته در ایران، عموماً به بررسی موضع آموزش به بیمار در قالب مطالعات توصیفی انجام شده‌اند. انجام یک مطالعه مرواری در این زمینه می‌تواند بهوضوح و یکپارچه‌سازی نتایج این مطالعات کمک کند. لذا، پژوهشگران بر آن شدند تا موضعی بر

^۱ Strömberg

این مقیاس، مقالات را از نظر فرآیند انتخاب (در ۴ بخش شامل: گویا بودن نمونه‌ها، حجم نمونه، عدم پاسخ‌دهی و ابزار اندازه‌گیری)، مقایسه پذیری (یک بخش شامل: بررسی مخدوش‌کننده‌ها و دیگر عوامل تأثیرگذار) و نتایج (از دو جنبه: ارزیابی نتیجه و آزمون‌های آماری) موردنظری قرار می‌دهد. بر اساس مقیاس Newcastle-Ottawa، مقالات از صفر (ضعیفترین مطالعه) تا ۱۰ (قوی‌ترین مطالعه) امتیازبندی می‌گردند. جهت حفظ داده‌ها، مطالعاتی که نمره کمتر از میانگین امتیازات (کمتر از امتیاز ۴) داشتند، با کیفیت پایین در نظر گرفته شدند. لذا ۲ مقاله به علت کیفیت پایین و یک مقاله به علت محتوای تکراری و گزارش مجدد اطلاعات در قالب مقاله جدید، حذف شدند. ارزیابی کیفیت مقالات با استفاده از مقیاس Newcastle-Ottawa در جدول (۱) نشان داده است.

با توجه به احتمال خطا و تورش در نمونه‌گیری، جمع‌آوری داده‌ها و گزارش نتایج مطالعات مختلف، موانعی با اهمیت در نظر گرفته شدند که بیش از ۴۰ درصد نمونه‌ها، آن مانع را در اجرای برنامه‌های آموزش به بیمار مؤثر بدانند. اطلاعات به دست آمده از مقالات، با توجه به اهداف مطالعه دسته‌بندی، مقایسه و خلاصه گردید. برای این کار از نرم‌افزار Microsoft Excel 2007 استفاده شد. مشخصات مقالات مرور شده، در جدول (۲) آمده است.

موردنظری قرار گرفت. روند ورود مطالعات به پژوهش در نمودار (۱)، نمایش داده شده است.

معیارهای ورود عبارت بودند از: انتشار مقاله به زبان فارسی یا انگلیسی، انجام پژوهش در ایران، دسترسی به متن کامل مقالات، مقالات پژوهشی اصیل (شامل مقالات توصیفی، تحلیلی و تحریبی)، گزارش موانع آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران و یا مدیران بالینی پرستاری و جدا از سایر گروه‌ها (نظیر دانشجویان یا بیماران). مقالات مزبوری و نامه به سردبیر، به علت عدم استفاده از داده‌های اولیه، انتخاب نشدند.

با مطالعه دقیق عنوان و چکیده مقالات واجد معیارهای ورود توسط محقق، تعداد زیادی از آن‌ها به علت ارتباط ضعیف یا غیر مرتبط باهدف مطالعه کنار گذاشته شدند. درصورتی که پس از مطالعه عنوان و چکیده، امکان تضمیم‌گیری در مورد مقاله وجود نداشت، به متن کامل آن رجوع شد. جهت اطمینان از بازیابی کلیه مدارک، فهرست منابع مقالات نیز مورد جستجو قرار گرفت. پس از بررسی هدف مطالعات و معیارهای ورود، ۲۷ مطالعه از نظر کیفیت توسط دو محقق به طور جداگانه ارزیابی شد. کیفیت این مقالات با استفاده از مقیاس ویرایش شده Newcastle-Ottawa (نسخه مطالعات مشاهده‌ای) (۲۰، ۲۱) موردنظری قرار گرفت.

جدول (۱): ارزیابی کیفیت مقالات واجد معیارهای ورود به مطالعه با استفاده از مقیاس Newcastle-Ottawa

ردیف	عنوان	مقیاس								مطالعه
		نتایج				فرآیند انتخاب				
نمره	نحوه	آزمون‌های	ارزیابی	بر اساس	ابزار	عدم	حجم	گویا بودن	نمونه‌ها	نمونه‌ها
ردیف	نحوه	آزمون‌های	ارزیابی	بر اساس	ابزار	عدم	حجم	گویا بودن	نمونه‌ها	نمونه‌ها
ردیف	نحوه	آزمون‌های	ارزیابی	بر اساس	ابزار	عدم	حجم	گویا بودن	نمونه‌ها	نمونه‌ها
(۲۲)	آرین و همکاران (۱۳۹۴)	۶	x	x	xx	x	x	x	x	x
(۲۰)	آفخانی و همکاران (۱۲)	۴		x	x	x	x	x	x	x
(۱۹)	برهانی (۱۳۸۰)	۴	x	x	x	x	x	x	x	x
(۲۳)	تقوی زادگان زاده و همکاران (۱۳۹۲)	۴	x	x	x	x	x	x	x	x
(۲۴)	حداد (۱۳۹۰)	۵	x	x	x	x	x	x	x	x
(۲۵)	حمزة گردشی و شاهحسینی (۲۰۱۴)	۴	x	x	x	x	x	x	x	x
(۲۶)	دهقانی و همکاران (۱۳۹۳)	۴		x	x	x	x	x	x	x
(۲۷)	رسنمی و همکاران (۱۳۸۹)	۴	x	x	x	x	x	x	x	x
(۲۸)	رمضانی و بادیه‌پیمای جهرمی (۲۰۱۵)	۴		x	x	x	x	x	x	x

نمره	نتایج			مقایسه پذیری			فرآیند انتخاب			مطالعه	ج
	کل	آزمون‌های ارزیابی	بر اساس طراحی و آماری	ابزار	عدم	حجم	گویا بودن نمونه‌ها	نمونه‌ها			
۴	x	x		x		x				رنجبر عزت‌آبادی و همکاران (۱۳۹۵)	(۲۹)
۵	x	x	x	x			x			ستارزاده و همکاران (۱۳۹۲)	(۳۰)
۴	x	x		x			x			سعیدپور و همکاران (۱۳۹۳)	(۳۱)
۵	x	x		x		x	x			سلطانی و همکاران (۱۳۹۲)	(۳۲)
۴	x	x		x		x				شاهحسینی و حمزه گردشی (۲۰۱۵)	(۳۳)
۳		x		x		x				عباسی و همکاران (۱۳۸۷)	(۳۴)
۵	x	x		x		x	x			عزیزنشاد و همکاران (۱۳۸۹)	(۳۵)
۵	x	x		x		x	x			قربانی و همکاران (۲۰۱۴)	(۹)
۴	x	x		x		x				گودرزی و همکاران (۱۳۸۳)	(۳۶)
۵	x	x		x		x	x			مردانیان دهکردی و همکاران (۱۳۸۳)	(۳۷)
۴		x		x		x	x			منصور قناعی و همکاران (۱۳۹۰)	(۱۴)
۵	x	x		x		x	x			موسوی و همکاران (۱۳۹۱)	(۱۸)
۵	x	x		x		x	x			میرزاچی علیوجه و همکاران (۲۰۱۶)	(۳۸)
۲		x		x						واحدیان عظیمی و همکاران (۱۳۹۰)	(۳۹)
۴	x	x		x		x				واحدیان عظیمی و همکاران (۱۳۹۰)	(۴۰)
۵	x	x		x		x	x			ورقایی پایدار و همکاران (۱۳۹۵)	(۴۱)
۴	x	x		x		x				وفایی نجار و شیدفر (۱۳۸۸)	(۴۲)
۴	x	x				x	x			هکاری و محمدزاده (۱۳۸۹)	(۴۳)


جدول (۲): مشخصات مقالات مرور شده مرتبط با موانع آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران در ایران

نوعنده مقاله	سال	نوع پژوهش	هدف پژوهش	محل مطالعه	روش	نمونه‌گیری	نامنونه‌ها	ج
قربانی و همکاران (۹)	۲۰۱۴	توصیفی؛ مقطعی	توصیف و مقایسه نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری در مورد موانع و تسهیل کننده‌های آموزش بیمار	سمنان	سرشماری	۱۰۳	پرستار، ۸۴	

نوع پژوهش	سال	نامینده مقاله	توضیفی؛ مقطعي	آقاخانی و همکاران	ج.
هدف پژوهش	محل مطالعه	روش نمونه‌گیری	ویژگی نمونه‌ها		
دانشجوی پرستاری					
از زیبایی نگرش پرستاران در مورد موانع آموزش به بیمار در بیمارستان‌های آموزشی					
۱۴۰ پرستار سرشماری ارومیه	۲۰۱۲	نویسنده مقاله	توصیفی؛ مقطعي	(۱۰) همکاران	
تعیین مهمترین عوامل بازدارنده و تسهیل‌کننده در امر آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران					
۹۹ پرستار سرشماری گیلان و بهیار	۱۳۹۰	منصور قناعی و همکاران	توصیفی؛ مقطعي	(۱۴)	
بررسی موانع آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای بهبود آن از دیدگاه کارکنان پرستاری بیمارستان					
۲۵۰ پرستار، ۲۰ مدیر سه‌میمه‌ای تصادفی کاشان	۱۳۹۱	موسی و همکاران	توصیفی؛ مقطعي	(۱۸)	
مقایسه نظرات پرستاران و مدیران در دسترس بیمار پرستاری					
۱۲۶ پرستار ۵۰ مدیر در دسترس کرمان	۱۳۸۰	برهانی	توصیفی؛ مقطعي	(۱۹)	
مقایسه عوامل انگیزشی و موانع آموزش به بیمار از دیدگاه مدیران و پرستاری					
۱۳۱ پرستار سرشماری بجنورد	۱۳۹۴	آرین و همکاران	توصیفی؛ مقطعي	(۲۲)	
بررسی موانع آموزش به بیمار سالمند از دیدگاه پرستاران و بیماران سالمند					
۵۰ پرستار، ۵۰ سالمند پرستاران، در دسترس برای بیماران سرشماری	۱۳۹۲	تقی زادگان زاده و همکاران	توصیفی؛ مقطعي	(۲۳)	
تعیین موانع موجود در آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان					
۱۲۵ پرستار سرشماری بیرون	۱۳۹۰	حداد	توصیفی؛ مقطعي	(۲۴)	
ارزیابی تسهیل‌کننده‌ها و موانع پرستاران در برنامه‌های آموزش مددجویان					
۳۶۱ پرستار آسان ساری	۲۰۱۴	حمزه گردشی و شاهحسینی	توصیفی؛ مقطعي	(۲۵)	
تبیین موانع آموزش به بیمار در ابعاد مدیریتی، فردی و مراقبتی در محیط بالین از دیدگاه پرستاران					
۲۸۰ پرستار سرشماری چهرم	۱۳۹۳	دهقانی و همکاران	توصیفی؛ مقطعي	(۲۶)	
بررسی موانع آموزش به بیمار از دید بیماران بستری و پرستاران شاغل و مقایسه آن‌ها					
۵۰ پرستار سرشماری بناب تبریز	۱۳۸۹	رستمی و همکاران	توصیفی؛ مقطعي	(۲۷)	
بررسی موانع و تسهیل‌کننده‌های آموزش بیماران از دیدگاه پرستاران					
۱۲۳ پرستار تصادفی چهرم	۲۰۱۵	رمضانی و بادیه‌پیمای جهرمی	توصیفی؛ مقطعي	(۲۸)	

ردیف	نویسنده مقاله	سال	نوع پژوهش	هدف پژوهش	محل مطالعه	روش نمونه‌گیری	ویژگی نمونه‌ها
۲۹	عزت‌آبادی و همکاران	۱۳۹۵	توصیفی؛ مقطعی	تعیین موانع موجود در روند آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران	یزد	سهمیه‌ای	۱۶۲ پرستار
۳۰	ستارزاده و همکاران	۱۳۹۲	توصیفی؛ مقطعی	ارزیابی جامع وضعیت آموزش به مددجو با استفاده از روش چند متغیره تحلیل عاملی	تهران	تصادفی ساده	۹۷ پرستار
۳۱	سعیدپور و همکاران	۱۳۹۳	توصیفی؛ مقطعی	بررسی دیدگاه پزشکان و پرستاران در رابطه با عوامل تسهیل‌کننده و موانع آموزش به بیمار	کرمانشاه	تصادفی	۸۵ پرستار و پزشک
۳۲	سلطانی و همکاران	۱۳۹۲	توصیفی؛ مقطعی	بررسی موانع آموزش بیمار از دیدگاه کارکنان و مدیران پرستاری	رفسنجان	سرشماری مدیر	۴۷ پرستار، مدیر پرستاری
۳۵	عزیزنشاد و همکاران	۱۳۸۹	توصیفی؛ مقطعی	بررسی موانع اجرای آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران و مدیران پرستاری	بابل	سرشماری مدیر	۲۰۶ پرستار
۳۶	گودرزی و همکاران	۱۳۸۳	توصیفی؛ مقطعی	بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند آموزش به مددجو از دیدگاه پرستاران	تهران	طبقه‌ای طبقه‌ای	۳۱۷ پرستار
۳۷	مردانیان دهکردی و همکاران	۱۳۸۳	توصیفی؛ مقطعی	تعیین درک پرستاران از آموزش به بیمار، عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده	اصفهان	تصادفی طبقه‌ای	۲۵۹ پرستار و سرپرستار
۳۸	میرزاچی علیوجه و همکاران	۲۰۱۶	توصیفی؛ مقطعی	تعیین نقش موانع آموزشی، سازمانی و شخصی آموزش بیمار از دیدگاه پرستاران	کرمانشاه	تصادفی ساده	۳۰۰ پرستار
۴۰	واحدیان عظیمی و همکاران	۱۳۹۰	توصیفی؛ مقطعی	بررسی مشکلات پرستاران بالینی در زمینه آموزش به بیمار	تهران	در دسترس	۱۴۵ پرستار
۴۱	ورقایی پایدار و همکاران	۱۳۹۵	توصیفی؛ مقطعی	شناسایی و مقایسه موانع مربوط به بیمار، پرستار و مدیریتی از دیدگاه بیماران بستری و پرستاران	تبریز	سرشماری بیمار	۱۸۴ پرستار
۴۲	وفایی نجار و شیدفر	۱۳۸۸	توصیفی؛ مقطعی	بررسی وضعیت ارائه خدمات آموزش بیمار و شناسایی موانع و عوامل تأثیرگذار سازمانی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت	مشهد	-	۷۰ پرستار، سرپرستار و مدیر پرستاری، پزشک

نوبت‌گذار	نوع پژوهش	سال	نویسنده مقاله	مکان
۴۴۱ بیمار نمونه‌ها	هدف پژوهش	۱۳۸۹	محمدزاده هکاری و	توصیفی؛ مقطعی
۳۵۲ پرستار، دانشجویی	تعیین وضعیت آموزش به بیمار در دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل و بررسی عوامل تأثیرگذار در آن	۱۳۸۹	پرستاری	تصادفی
۲۴۱ پرستاری	تبزیز	۱۳۸۹	محمدزاده هکاری و	دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل و بررسی عوامل تأثیرگذار در آن



نمودار (۱): روند ورود مطالعات به پژوهش

در دسترس (۳ مقاله) و سهمیه‌ای (۲ مقاله) بود. یک مقاله نیز به روشننمونه‌گیری اشاره نکرده بود. تمام مطالعات از پرسشنامه‌های پژوهشگر ساخته استفاده نموده‌اند. نمونه‌ها در ۱۲ مطالعه، محدود به گروه پرستاران بود. اطلاعات تمام مطالعات از بیمارستان‌ها جمع‌آوری شده است.

پس از مرور نتایج پژوهش‌ها، موانع آموزش به بیمار در ۵ حیطه، دستیندی شدن؛ شامال؛ (۱) موانع مرتبط با پرستاران، (۲) موانع

یافته ها

درنهایت، ۲۴ مقاله مورد بررسی قرار گرفت. تمام مقالات از نوع توصیفی مقطعي بودند. سال انتشار مقالات از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ متغیر بود. ۵ مقاله به زبان انگلیسي (۹، ۱۰، ۲۸، ۲۵ و ۳۸) و بقیه مقالات به زبان فارسي منتشر شده‌اند. روش نمونه‌گیری اکثر مقالات، به صورت سرشماري (۱۰ مقاله)، بود. ديگر روش‌هاي مورد استفاده برای نمونه‌گیري، روش تصادفي ساده (۴ مقاله)، طبقه‌بندی (۴ مقاله)،

امتیاز و در نظر گرفتن آن در ارزشیابی‌ها و سوابق کاری پرستاران" را مهم‌ترین مانع مدیریتی در نظر گرفتند. چهار مطالعه دیگر، گزارش کردند که عدم توجه و حمایت لازم از سوی مدیران مانع پراهمیت در این حیطه به حساب می‌آید (۱۹، ۲۵، ۳۱، ۳۵). همچنین از دیدگاه پرستاران در بعضی مطالعات مؤثرترین مانع، نوبتهای کاری و شیفت‌های فشرده است که مانع از اجرای آموزش به بیماران می‌گردد (۱۰، ۲۴، ۱۸).

موانع سازمانی در آموزش به بیمار:

نکته قابل توجه آن است که اکثر مطالعات مرور شده، از کمبود پرستاران و عدم تناسب تعداد بیماران با پرسنل مراقبتی، به عنوان مهم‌ترین مانع سازمانی در اجرای برنامه‌های آموزش به بیمار، یاد می‌کنند. این در حالی است که فقط مطالعه رمضانی و بادیه‌پیمای جهرمی (۲۸)، آخاخانی و همکاران (۱۰) و برهانی (۱۹) به معضلات فضای آموزشی برای اجرای برنامه‌های مربوطه، به عنوان مؤثرترین مانع سازمانی اشاره می‌کنند.

موانع محیطی در آموزش به بیمار:

از ۲۴ مطالعه، ۹ مطالعه گزارش داده‌اند که عدم همکاری سایر اعضاً تیم بهداشتی درمانی با پرستاران از معضلات اصلی و مهم‌ترین عامل محیطی در اجرای آموزش به بیمار هستند (۱۹، ۱۴، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۳۸، ۴۱)، اما در مطالعه موسوی و همکاران (۱۸)، واحدیان عظیمی و همکاران (۴۰) و حمزه گردشی و شاه‌حسینی (۲۵)، گزارش شده که فرآیندهای تشریفاتی، اداری و غیرحرحفه‌ای که توسط پرستاران اجرا می‌گردد، نسبت به سایر عوامل محیطی از اهمیت بیشتری برخوردار است. سایر مطالعات در مورد موانع محیطی، به موانع این حیطه اشاره نکرده بودند.

مانع آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران در مقالات مرور شده، به طور کامل در جدول (۳) بیان شده است.

مرتبط با بیماران، (۳) موانع مدیریتی، (۴) موانع سازمانی و (۵) موانع محیطی. در بین تمام عوامل، موانع مربوط به پرستار از فراوانی بیشتری برخوردار بود.

موانع مرتب‌با پرستاران در اجرای آموزش به بیمار:

در ۱۵ مطالعه، پرستاران بر این باور بودند که مهم‌ترین مانع جهت اجرای برنامه‌های آموزش به بیمار در حیطه پرستاران، کمبود وقت پرستار به دلیل تراکم کاری است (۱۸، ۹، ۳۲، ۲۹، ۲۷-۲۲، ۴۳، ۳۶، ۴۲، ۳۸). در مطالعه واحدیان عظیمی و همکاران (۴۰) و همچنین رمضانی و بادیه‌پیمای جهرمی (۲۸) نیز، کمبود دانش و اطلاعات پرستاران در مورد مراقبت بیماری‌های مختلف، به عنوان مهم‌ترین مانع مراقبتی معرفی شد؛ اما منصور قناعی و همکاران (۱۴) و سعیدپور و همکاران (۳۱) به ناتوانی آموزش‌دهنده در طراحی و اجرای برنامه آموزشی به عنوان مهم‌ترین مانع مربوط به پرستاران در آموزش به بیمار اشاره می‌کنند.

موانع مرتب‌با بیماران در آموزش به بیمار:

در مطالعات منصور قناعی و همکاران (۱۴)، موسوی و همکاران (۱۸)، واحدیان عظیمی و همکاران (۴۰) و رمضانی و بادیه‌پیمای جهرمی (۲۸)، پرستاران اعتقاد داشتند که تأثیرگذارترین مانع آموزش به بیمار در حیطه بیماران، مربوط به وضعیت عمومی نامساعد بیماران و شرایط جسمی روحی نامناسب آن‌ها می‌باشد. در حالی که در مطالعه رستمی و همکاران (۲۷)، آرین و همکاران (۲۲) و قربانی و همکاران (۹)، کم‌سوادی یا بی‌سوادی بیماران و به تبع آن، عدم درک محتوای آموزش، مهم‌تر گزارش شدند.

موانع مدیریتی در آموزش به بیمار:

از میان مطالعات مرور شده، پژوهش دهقانی و همکاران (۲۶)، ورقایی پایدار و همکاران (۴۱)، قربانی و همکاران (۹) و میرزایی علوفیجه و همکاران (۳۸)، "لحاظ کردن آموزش به بیمار به عنوان یک

جدول (۳): موانع اجرای برنامه‌های آموزش به بیماران از دیدگاه پرستاران در ایران

حیطه	مانع آموزش به بیمار	مطالعات
کمبود وقت به دلیل تراکم کاری پرستاران	کمبود دانش و اطلاعات در مورد موضوعات تخصصی و ابعاد مختلف بیماری‌ها	(۴۳، ۳۸-۳۵)
عدم برناهای ریزی آموزش به بیمار در کار روزانه پرستاران به عنوان یک وظیفه	ناتوانی آموزش‌دهنده در طراحی و اجرای برنامه آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی بیمار	(۳۸، ۳۱، ۲۶، ۲۵، ۱۹، ۱۸، ۱۰)
عدم مهارت کافی و توانایی در برقراری ارتباط با بیمار توسط کادر درمانی	عدم آگاهی پرستار از روش‌ها، فنون آموزش و کاربرد وسایل کمک‌آموزشی	(۳۲-۳۰، ۱۴، ۹)
بی‌علقگی پرستار نسبت به انجام آموزش به بیمار	عدم آگاهی پرستار از روش‌ها، فنون آموزش و کاربرد وسایل کمک‌آموزشی	(۳۸، ۳۷، ۳۲، ۲۶)
		(۳۲، ۳۰، ۱۹، ۱۰)

حیطه	موضع آموزش به بیمار	مطالعات
۱	عدم اعتماد به نفس و اعتقاد به نقش آموزشی پرستار	(۳۸، ۳۲، ۳۱، ۱۹)
۲	ناتوانی در برقراری ارتباط با قومیت‌های ایرانی (ترک، لر و ...)	(۳۸، ۲۶، ۲۵)
۳	عدم وجود انگیزه در پرستاران جهت آموزش به بیمار	(۳۱، ۲۹، ۲۴)
۴	احساس شرم در ارائه بعضی از آموزش‌های خاص به بیماران (نظیر مسائل جنسی)	(۳۸، ۲۶)
۵	عدم آگاهی از حقوق بیماران در امر آموزش به بیمار	(۳۸، ۲۶)
۶	فقدان احساس مسئولیت پرستاران در قبال آموزش به بیمار	(۳۸، ۳۷)
۷	عدم دقت در ثبت دیگر گزارش‌ها در مقایسه با ثبت آموزش به بیمار	(۱۴)
۸	عدم آمادگی جسمی و روحی و وضعیت نامساعد بیمار در زمان اجرای آموزش	، ۲۸-۲۶، ۲۳، ۲۲، ۱۸، ۱۴، ۱۰، ۹) (۴۰، ۳۸، ۳۲
۹	فقدان علاقه بیمار جهت پذیرش مطالب و تغییر رفتار	(۳۸، ۳۲، ۳۱، ۲۷، ۲۳، ۱۰، ۹)
۱۰	عدم همکاری بیمار و بی‌توجهی وی به مسئله آموزش	(۳۸، ۳۰، ۲۷، ۲۶، ۲۳، ۲۲)
۱۱	کمبود یا عدم انگیزه یادگیری در بیماران برای آموزش	(۳۲-۳۰، ۲۷، ۲۶، ۱۹)
۱۲	مشکلات برقراری ارتباط با بیمار به خاطر عقاید فرهنگی، اجتماعی و مذهبی بیمار	(۴۰، ۳۲، ۳۰، ۱۹، ۱۰، ۹)
۱۳	کوتاه بودن مدت بستره بیماران در بخش	(۳۸، ۳۲، ۲۶، ۱۹، ۱۰)
۱۴	عدم درک محتوای آموزشی به علت بی‌سوادی یا کم‌سوادی	(۳۲، ۲۷، ۲۳، ۲۲، ۹)
۱۵	شناخته نشدن نقش پرستار به عنوان معلم نزد بیماران و جامعه	(۳۸، ۲۶، ۱۰)
۱۶	بی‌اعتمادی بیمار و خانواده‌اش به پرستار به عنوان فردی آگاه و ماهر در امر آموزش	(۳۸، ۲۸، ۲۶)
۱۷	ناتوانی بیمار در مراقبت از خود	(۳۲، ۲۷، ۲۳)
۱۸	عدم آگاهی بیماران از حق خود برای اخذ آموزش	(۳۲، ۲۷)
۱۹	تمایل مددجویان به گرفتن آموزش از طرف پزشکان	(۳۶، ۱۹)
۲۰	عدم توجه و حمایت لازم از سوی مدیران در زمینه رفع نیازهای آموزشی بیمار	، ۳۵، ۳۱، ۲۹، ۲۷-۲۵، ۱۹، ۱۸، ۹) (۳۸
۲۱	عدم اختصاص بودجه کافی در زمینه آموزش به بیمار	، ۳۲، ۳۱، ۲۹، ۲۷، ۲۶، ۱۹، ۱۰)
۲۲	لحاظ نکردن آموزش به بیمار به عنوان امتیاز و یا یک مؤلفه ارزشیابی در سوابق کاری پرستار	(۴۱، ۳۸، ۳۱، ۲۶، ۲۴، ۱۹، ۱۸، ۹)
۲۳	در اولویت قرار ندادن آموزش در شرح وظایف پرستاری	(۳۸-۳۶، ۳۰، ۲۸، ۲۶)
۲۴	عدم وجود سیستم نظارت و بازخورد مناسب در مورد آموزش به بیمار	(۴۰، ۳۸، ۳۲، ۲۶، ۲۴)
۲۵	نویتهای کاری فشرده و پشت سر هم پرستاران	(۳۱، ۲۹، ۲۴، ۱۸، ۱۰)
۲۶	فقدان یا کاهش رضایت شغلی پرستاران	(۲۷، ۲۳، ۱۰)
۲۷	عدم ارزش‌گذاری مادی و معنوی برای پرستاران در امر آموزش به بیمار	(۳۸، ۲۶، ۱۸)
۲۸	عدم اجرای طرح انطباق جنسیتی و کمبود پرستار هم‌جنس بیمار	(۳۸، ۲۲، ۳۰)
۲۹	عدم وجود قوانین مدون در زمینه آموزش بیمار	(۳۰، ۲۷، ۲۲)
۳۰	عدم وجود برنامه‌ریزی منظم جهت اجرای آموزش بیمار	(۳۲، ۲۷، ۲۲)
۳۱	کمبود دوره‌های بازآموزی برای پرستاران در این زمینه	(۴۰، ۱۸)
۳۲	ارائه آموزش به شکل غیررسمی و عدم تأکید بر ثبت آن	(۳۶)
۳۳	عدم تناسب تعداد بیماران با تعداد پرستاران	، ۳۲، ۳۱، ۲۹-۲۶، ۲۴-۲۲، ۱۸، ۹) (۴۳، ۴۱، ۴۰، ۳۸-۳۵

حیطه	مowanع آموزش به بیمار	مowanع آموزش به بیمار	مطالعات
عدم وجود وسایل کمکآموزشی و منابع آموزشی مکتوب	کمبود یا عدم وجود فضای آموزشی مناسب برای آموزش به بیمار	-۳۵، ۳۲، ۲۸-۲۶، ۲۲، ۱۹، ۱۸، ۱۰، ۹ (۴۳، ۳۸-۳۵)	
کمبود یا عدم وجود فضای آموزشی مناسب برای آموزش به بیمار	وجود نظام مراقبتی پزشک محور و کاهش انگیزه و بی میلی پرستاران جهت آموزش به بیمار	-۳۵، ۳۲، ۲۸-۲۶، ۱۹، ۱۸، ۱۰، ۹ (۴۳، ۳۸)	
آموزشی بودن بیمارستان و تحمیل کارهای اضافی توسط پزشکان بی تجربه	آموزشی بین پرستاران در شیفت‌های مختلف و درنتیجه تداوم نداشتن امر آموزش	(۴۰)	
عدم همکاری سایر اعضای تیم بهداشتی درمانی با پرستاران در خصوص اجرای برنامه‌های آموزشی به بیمار	عدم همکاری سایر اعضای تیم بهداشتی درمانی با پرستاران در خصوص اجرای برنامه‌های آموزشی به بیمار	۳۵، ۳۲-۳۰، ۱۹، ۱۴ (۴۱، ۳۸)	
عدم ارتباط و هماهنگی بین پرستاران در شیفت‌های مختلف و درنتیجه تداوم نداشتن امر آموزش	عدم ارتباط و هماهنگی بین پرستاران در شیفت‌های مختلف و درنتیجه تداوم نداشتن امر آموزش	(۳۸، ۳۰، ۲۸، ۲۶)	
انجام امور غیرحرفه‌ای و فرآیندهای اضافی کار از قبیل تشریفات و سلسه‌های اداری	انجام امور غیرحرفه‌ای و فرآیندهای اضافی کار از قبیل تشریفات و سلسه‌های اداری	(۴۰، ۲۵، ۱۸)	
اختلاف نظر متخصصین امر در مورد محتوای آموزش به بیمار	اختلاف نظر متخصصین امر در مورد محتوای آموزش به بیمار	(۲۷)	

بحث و نتیجه‌گیری

مرور حاضر باهدف بررسی موانع اجرای برنامه‌های آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران در ایران انجام شد.

نتایج نشان داد که "کمبود وقت در ارتباط با تراکم کاری پرستار" از دیدگاه پرستاران به عنوان مهم‌ترین موانع آموزش به بیمار در ایران بحساب می‌آید. مطالعات در سایر کشورها نظیر امریکا، چین و کلمبیا مهم‌ترین مانع آموزش به بیمار را حجم کاری سنگین پرستاران می‌دانند (۱۱، ۴۶-۴۴). این مسئله موجب می‌شود که پرستاران، زمان کمتری برای هر بیمار، صرف کنند و همین محدودیت زمانی مانع اجرای برنامه‌های آموزش به بیماران می‌گردد (۴۷). علاوه بر این موارد، برخی وظایف غیرحرفه‌ای در بیمارستان نظیر هماهنگی، حمل و نقل بیماران و سایر خدمات جانبی نیز بر عهده پرستاران گذاشته می‌شود که خود حجم کاری آن‌ها را افزایش می‌دهد (۴۸).

از دیگر موانع آموزش به بیمار می‌توان به "عدم تناسب تعداد بیماران با تعداد پرسنل پرستاری" اشاره کرد. کمبود نیروی پرستاری در بسیاری از کشورها مثل ایران، موضوعی جدی است و در حال حاضر پرسنل پرستاری به تنهایی این وظیفه سنگین را به دوش می‌کشند (۴۹، ۵۰). این کمبود نیرو منجر به ایجاد اضافه کاری‌های متعدد و شیفت‌های فشرده کاری پرسنل پرستاری می‌گردد. لذا این عوامل از یک سو موجب خستگی‌های جسمی و روحی و فرسودگی شغلی شده و از سوی دیگر فرصت کافی برای ارائه آموزش مناسب به بیمار را از پرستاران سلب می‌نماید.

با توجه به مانع "کمبود یا عدم وجود فضا، وسایل و منابع آموزشی مناسب برای آموزش" قرار دادن فضای خاص در محل کار برای آموزش به بیمار، تجهیز و به کارگیری یک یا چند پرستار

متخصص برای این فعالیت، جهت بهبود و توسعه آموزش به بیمار توصیه می‌شود (۵۱).

یکی دیگر از موانع، سطح سواد بیماران است که به عنوان عامل مشارکت در مراقبت‌های بهداشتی، بالهمیت محسب می‌شود (۵۲). افراد بی‌سواد و کم‌سواد نمی‌توانند آگاهی‌ها و مهارت‌های لازم برای مراقبت از خود را کسب نمایند، زیرا طرفیت کسب، پردازش و درک اطلاعات تا حدودی به سطح سواد افراد وابسته است (۵۳). همچنین رابطه مستقیمی بین سطح سواد و همکاری افراد در سیستم مراقبتی درمانی وجود دارد (۵۴).

از موانع مدیریتی آموزش به بیمار، عدم توجه و حمایت لازم از سوی مدیران در زمینه رفع نیازهای آموزشی است که نیازمند حمایت کامل مدیران، بعویظه در مورد اختصاص زمان برای فعالیت‌های آموزشی پرستاران و هماهنگی مسئولیت‌های آموزشی جهت آموزش به بیمار است (۵۵). لذا تغییرات در سبک مدیریتی، پروتکل‌های آموزشی و در نظر گرفتن فعالیت آموزشی پرستاران در ارزشیابی و سوابق کاری پرستاران، موجب بهبود این برنامه‌ها می‌گردد (۹).

آموزش به بیمار یک استراتژی پایدار در جهت کاهش خطرات بهداشتی درمانی و افزایش کیفیت زندگی بیماران است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که پرستاران در اجرای برنامه‌های آموزش به بیمار با مانع گوناگونی روبرو هستند که بیشتر آن‌ها مرتبط با پرسنل پرستاری است.

با توجه به هزینه اثربخش بودن آموزش به بیمار ضروری است مسئولین امر با اتخاذ تدبیری همچون جذب تعداد کافی نیروی پرستاری، در اولویت قرار دادن آموزش توسط پرستاران، اختصاص فضای آموزشی مناسب و تجهیز آن، نظارت و تشویق مناسب

و یا منتشرنشده، از دست رفته باشد. علاوه بر این، مطالعه حاضر تنها به مرور مقالاتی پرداخت که به زبان فارسی یا انگلیسی منتشر شده بودند. لذا ممکن است مطالعاتی به زبانهای دیگر منتشر شده باشند. که به دلیل محدودیت زبانی در مطالعه حاضر لحاظ نشده باشند.

تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله از تمام محققانی که مقالات آن‌ها در این مطالعه موردنبررسی قرار گرفت، تشکر و قدردانی می‌گردد.

پرستاران در این زمینه و اختصاص بودجه کافی به امر آموزش، در جهت رفع موانع آموزش به بیمار اقدام کنند. همچنین برای تحقیقات بعدی، توصیه می‌شود تا اثربخشی هریک از تدبیر ذکر شده در برنامه‌های آموزش به مددجو موردنبررسی قرار گیرد. به علاوه، توصیه می‌شود مطالعات اختصاصی جهت بررسی موانع آموزش به بیمار به خصوص در گروه‌های خاص مانند سالمدان اجرا گردد. از محدودیت‌های این مطالعه می‌توان به این نکته اشاره کرد که اگرچه مقالات واحد معیارهای ورود و کیفیت قابل قبول، شناسایی و موردنبررسی قرار گرفتند، اما ممکن است بعضی از مطالعات کاغذی

References:

- Moonaghi HK, Hasanzadeh F, Shamsoddini S, Emamimoghadam Z, Ebrahimzadeh S. A comparison of face to face and video-based education on attitude related to diet and fluids: Adherence in hemodialysis patients. *Iran J Nurs Midwifery Res* 2012;17(5): 360.
- Helliwell PS, Ibrahim G. Ethnic differences in responses to disease modifying drugs. *Rheumatol (Oxford)* 2003;42(10): 1197-201.
- Miller MA, Stoeckel PR. Client education: Theory and practice. Jones & Bartlett Publishers; 2015.
- Mohammad Pour A, Dehgan Naieri N. The survey of the patient educational need on discharge phase in Gonabad health and treatment centers. *Horizon Med Sci* 2007;12(4): 34-9.
- Dehghani H, Dehghani K. The physicians and nurses opinions about the obstacles to educating the patients. *J Shahid Sadoughi Univ Med Sci Health Serv* 1997;3(5): 54-60.
- Bastable SB. Nurse as educator: Principles of teaching and learning for nursing practice. Jones & Bartlett Learning; 2003.
- Ignatavicius DD, Workman ML, Mishler MA. Medical-surgical nursing across the health care continuum. WB Saunders Company; 1998.
- Habel M. Helping patient family takes charge of their health. *Patient Educ* 2002;31: 246-48.
- Ghorbani R, Soleimani M, Zeinali MR, Davaji M. Iranian nurses and nursing students' attitudes on barriers and facilitators to patient education: a survey study. *Nurse Educ Pract* 2014;14(5): 551-6.
- Aghakhani N, Nia HS, Ranjbar H, Rahbar N, Beheshti Z. Nurses' attitude to patient education barriers in educational hospitals of Urmia University of medical sciences. *Iran J Nurs Midwifery Res* 2012;17(1): 12-5.
- Marcum J, Ridenour M, Shaff G, Hammons M, Taylor M. A study of professional nurses' perceptions of patient education. *J Contin Educ Nurs* 2002;33(3): 112-8.
- Valentine F. Effective Leadership and Management in Nursing. *J Clin Nurs* 2008;17(6): 840.
- Strömberg A. The crucial role of patient education in heart failure. *Eur J Heart Fail* 2005;7(3): 363-9.
- Mansourghanaei R, Majidi S, Tabari R. Nurses viewpoints about facilitator and inhibitor factors of patients education. *Res in Med Educ* 2011;3(1): 27-33.
- Nsemo AD, John ME, Etifit RE, Mgbekem MA, Oyira EJ. Clinical nurses' perception of continuing professional education as a tool for quality service delivery in public hospitals Calabar, Cross River State, Nigeria. *Nurs Educ Pract* 2013;13(4): 328-34.
- Ni C, Hua Y, Shao P, Wallen GR, Xu S, Li L. Continuing education among Chinese nurses: A general hospital-based study. *Nurs Educ Today* 2014;34(4): 592-7.

17. Chong MC, Sellick K, Francis K, Abdullah KL. What influences Malaysian nurses to participate in continuing professional education activities? *Asian Nurs Res* 2011;5(1): 38-47.
18. Mousavi MS, Taghadosi M, Rezaie Shahsavarloo Z, lotfi MS. Nursing staff views about the barriers to patient education and provided strategies to improve it in hospitals affiliated to Kashan university of medical sciences, 1391. *J Urmia Nurs Midwifery Fac* 2014;12(9): 842-9.
19. Borhani F. Nurses and nurse-manager's opinions about the importance of patient's training barriers. *J Qazvin Univ Med Sci* 2002;5(4): 84-90.
20. Herzog R, Álvarez-Pasquin MJ, Díaz C, Del Barrio JL, Estrada JM, Gil Á. Are healthcare workers' intentions to vaccinate related to their knowledge, beliefs and attitudes? A systematic review. *BMC Public Health* 2013;13(1): 154.
21. Wells G, Shea B, O'connell D, Peterson J, Welch V, Losos M, et al. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality if nonrandomized studies in meta-analyses 2009 [2017 July 03]. Available from: http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp.
22. Arian M, Mortazavi H, TabatabaeiChehr M, Tayebi V, Gazerani A. The comparison between motivational factors and barriers to patient education based on the viewpoints of nurses and nurse managers. *J Nurs Educ* 2015;4(3): 66-77.
23. Taghizadeganzadeh M, Ravanipour M, Jahanpour F, Sobhanian S, Motamed N. Barriers to educating the elderly patients from the perspectives of the nurses in the hospital of Bushehr University of Medical Sciences in 2014. *J Commun Health Res* 2014;7(4): 37-44.
24. Haddad M. Viewpoints of employed nurses in hospitals of Birjand city regarding existing barriers in patient education. *Mod Care J* 2011;8(3): 152-8.
25. Hamzehgardeshi Z, Shahhosseini Z. A cross-sectional study of facilitators and barriers of Iranian nurses' participation in continuing education programs. *Glob J Health Sci* 2014;6(2): 183.
26. Dehghani A, Orang M, Abdollahi FS, Parvianian NAM, Vejdani MA. Barriers to patient education in clinical care; viewpoints of nurses. *Iran J Med Educ* 2014;14(4): 332-41.
27. Rostami H, Montazam SH, Ghahremanian A. Survey of education barriers from nurses and patients viewpoint. *Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac* 2010;18(1): 50-60.
28. Ramezanli S, Badiyepemayie Jahromi Z. Iranian nurses' views on barriers and facilitators in patient education: a cross-sectional study. *Glob J Health Sci* 2015;7(5): 288-93.
29. Ranjbar Ezzatabadi M, Mahdian M, Eslami H, Amini A. Patient education barriers from nurses' opinions. *J Holist Nurs Midwifery* 2016;26(3): 36-45.
30. Zareiyan A, Sattarzadeh M, Danaei S. Exploratory analysis of factors influencing client education in NAJA Vali-e-Asr hospital: a cross-sectional study. *J Police Med* 2013;2(3): 151-8.
31. SaeidPour J, Ghazi Asgar M, Rahmani H, Khoshkho M. Surveying doctors and nurses viewpoints on enhancing and inhibiting factors of educating patients. *J Hosp* 2014;13(1): 61-7.
32. Sultani A, Hadavi M, Heydari S, Shahabinezhad M. Barriers to patient education based on the viewpoints of nurses and nurse managers in hospitals of Rafsanjan university of medical sciences, 2008. *J Rafsanjan Univ Med Sci* 2013;12(4): 309-18.
33. Shahhosseini Z, Hamzehgardeshi Z. The facilitators and barriers to nurses' participation in continuing education programs: a mixed method explanatory sequential study. *Glob J Health Sci* 2015;7(3): 184.

34. Abbasi M, Novruzi M, Mehran N. The assessment of barriers to patient education from nurses' point of view and its facilitator's model in teaching hospitals of Qom university of medical sciences in 2007. *J Hosp* 2008;7(3): 13-6.
35. Aziznejad P, Zabihi A, Hosseini, SJ, Bijani A. Nurses and nurse manager's opinions about the patient's training barriers. *J Babol Univ Med Sci* 2010;12(5): 60-4.
36. Goudarzi Z, Khosravi K, Bahrani N, Vaskooii K, Valipourgavgany P, Ghoghaei S, et al. A study of professional nurses' perceptions of factors affecting the process of client education. *Hayat* 2005;10(4): 57-65.
37. Mardanian Dehkordi L, Salahshorian A, Mohammad Alayha J, Hosseini F. Nurses' perception of patient teaching, enhancing and inhibiting factors. *Iran J Nurs* 2005;17(40): 18-27.
38. Mirzaei-Alavijeh M, Jalilian F, Karami-Matin B, Hosseini SN, Ahmadi Jouybari T, Mahboubi M, et al. Patient education in nursing: investigation the role of individual and organizational barriers. *Res J Appl Sci* 2016(11): 704-8.
39. Vahedian Azimi A, Alhani Fi, Hedayat K. Barriers and facilitators of patient's education: nurses' perspectives. *Iran J Med Educ* 2012;11(6): 620-34.
40. Vahedian Azimi A, Payami Bosari M, Gohari Moghaddam K. A survey on nurses' clinical problems in patient education. *J Urmia Nurs Midwifery Fac* 2011;9(4): 295-305.
41. Varghaei-Paidar A, Zareh Gavgani V, Hassannejhad N, Ranjbar S, Hosseinzadeh M, Imani S. A survey of nurses' and patients' opinions about patient education and training and possible barriers in Madani cardiovascular health and education center. *Depiction Health* 2017;7(4): 22-9.
42. Vafayi A, Shidfar MR. The situation of providing patient education services and organizational factors affecting it in Mashhad university hospitals -1387. *J Healthc Manag* 2009;1(1): 31-40.
43. Hekari D, Mohammadzadeh R. Quality of patients' education by nursing students and employment nurses and its effective factors in Tabriz hospitals in 2007-2008. *Med Sci J* 2010;20(1): 58-63.
44. Barber-Parker ED. Integrating patient teaching into bedside patient care: a participant-observation study of hospital nurses. *Patient Educ Couns* 2002;48(2): 107-13.
45. Raffray M, Semenic S, Osorio Galeano S, Ochoa Marin SC. Barriers and facilitators to preparing families with premature infants for discharge home from the neonatal unit. *Perceptions of health care providers. Invest Educ Enferm* 2014;32(3): 379-92.
46. Tse KY, So WK. Nurses' perceptions of preoperative teaching for ambulatory surgical patients. *J Adv Nurs* 2008;63(6): 619-25.
47. Huey FL, Hartley S. What keeps nurses in nursing. *Am J Nurs* 1988;88(2): 181-8.
48. Griffith CH, Wilson JF, Desai NS, Rich EC. Housestaff workload and procedure frequency in the neonatal intensive care unit. *Crit Care Med* 1999;27(4): 815-20.
49. Mehrdad N, Salsali M, Kazemnejad A. The spectrum of barriers to and facilitators of research utilization in Iranian nursing. *J Clin Nurs* 2008;17(16): 2194-202.
50. Jafaraghene F, Mehrdad N, Parvizy S. Influencing factors on professional commitment in Iranian nurses: A qualitative study. *Iran J Nurs Midwifery Res* 2014;19(3): 301-8.
51. Bergh AL, Persson E, Karlsson J, Friberg F. Registered nurses' perceptions of conditions for patient education-focusing on aspects of competence. *Scand J Caring Sci* 2014;28(3): 523-36.
52. Jordan JE, Buchbinder R, Osborne RH. Conceptualising health literacy from the patient

- perspective. Patient Educ Couns 2010;79(1): 36-42.
53. La Vonne A, Zun LS. Assessing adult health literacy in urban healthcare settings. J Natl Med Assoc 2008;100(11): 1304.
54. Peerson A, Saunders M. Health literacy revisited: what do we mean and why does it matter? Health Promot Int 2009;24(3): 285-96.
55. Casey D. Findings from non-participant observational data concerning health promoting nursing practice in the acute hospital setting focusing on generalist nurses. J Clin Nurs 2007;16(3): 580-92.

THE BARRIERS TO PATIENT EDUCATION FROM THE VIEWPOINT OF NURSES IN IRAN: A SYSTEMATIC REVIEW

Mohsen Adib-Hajbaghery^{1}, Mohammad Zare²*

Received: 12 May, 2017; Accepted: 12 Aug, 2017

Abstract

Background & Aims: Patient education is one of the important aspects of nursing care and key roles of nurses. In this context, recognizing its barriers can greatly influence on the process of improving the quality of patient education. The aim of this study was to investigate the barriers to patient education from the viewpoint of nurses in Iran.

Material & Methods: In this review study, research articles related to barriers of patient education from the viewpoint of nurses were searched in Persian and English languages and without time limitation in these databases: PubMed, ISI, ERIC, Science Direct, Scopus, Proquest, Google Scholar, MagIran, SID, IranDoc and IranMedex. Doing research in Iran was the main inclusion criterion. After evaluating entry criteria and quality of the articles, 24 articles were analyzed.

Results: A wide range of barriers were presented in studies. After the categorization, five main areas were identified: 1) Barriers related to nurses: Lack of time due to workload of nursing staffing; 2) Barriers related to patients: the patient's unfavorable physical and psychic status; 3) Management barriers: lack of managers' support; 4) Organizational obstacles: the inappropriateness of nurse-patients ratio; 5) Environmental barriers: lack of cooperation of the medical team members to implement educational programs.

Conclusion: Most of the barriers to patient education are those of related to nurses. To improve the status of patient education, it is essential for managers to encourage nurses in this important task by adopting measures such as increasing in nursing staffing, allocating sufficient funds and proper supervision.

Keywords: Patient Education, Barriers, Viewpoint of Nurses, Nursing, Systematic Review, Iran.

Address: Kashan, Faculty of Nursing and Midwifery, Kashan University of Medical Sciences

Tel: (+98) 03155546633

Email: adib1344@yahoo.com

¹ Professor, Trauma Nursing Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran (Corresponding Author)

² M.Sc. Student in Geriatric Nursing, Department of Medical-Surgical Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran